

Vamos al colegio... ...pero ¡SIN ELLOS!

Esquema de tratamiento ante los piojos



SOSPECHA DE PEDICULOSIS

(Picor y rascado frecuente; presencia de piojos en personas del entorno)

**EXISTEN PIOJOS ADULTOS
Y LIENDRES VIVOS**

**Observación y
cepillado con lendrera**

**AUSENCIA DE PIOJOS
ADULTOS VIVOS**

TRATAMIENTO PEDICULICIDA

Recomendado: loción de permetrina 1,5% + cepillado con lendrera

NO TRATAR

Observación y cepillado regular

Repetir tratamiento a los 7-10 días

Observación y cepillado a la semana del 2º tratamiento

Ausencia de piojos

Presencia de piojos adultos vivos y larvas vivas

Presencia de piojos adultos vivos
y ausencia de larvas

TRATAMIENTO EFICAZ

¿Aplicación correcta?

↓	↓
SÍ	NO
↓	↓
Resistencia	Educación sanitaria

Reinfestación

Control contactos

TRATAMIENTO ALTERNATIVO (Consulta pediátrica)



**EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 2 AÑOS NO SE RECOMIENDA
EL USO DE NINGÚN PRODUCTO
PEDICULICIDA.**



En caso de intoxicación
contacte con el
INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA
91-562-04-20



Vamos al colegio...

...pero

¡SIN ELLOS!



Medidas Preventivas



Observar si el niño y la niña se rascan la cabeza.

Revisar periódicamente la nuca y la parte de detrás de las orejas, tanto en los escolares como en los adultos que tengan contacto con ellos.



Lavar la cabeza con frecuencia con champú normal y cepillar el pelo.



El uso de productos pediculicidas con fines preventivos no se recomienda.

No es conveniente adoptar públicamente medidas de aislamiento y marginación de los escolares infestados por piojos.

Tratamiento



- La utilización de productos pediculicidas debe realizarse con precaución. Inicie el tratamiento sólo si se descubre piojos o liendres.
- Aplique al cuero cabelludo una **loción antiparasitaria** (permetrina 1,5%) siguiendo, correctamente, las instrucciones del fabricante.
- Deje actuar entre **10 y 30 minutos**.
- Después, lave la cabeza con un champú normal.
- Deje secar al aire y no utilice secador.

- Retire los piojos y las liendres con la mano o con la lendrera, siempre con el cabello humedecido.
- **Repita el tratamiento a los 7 ó 10 días, exactamente igual.**
- Siga revisando el pelo en busca de liendres hasta que no quede ninguna.
- Vigile a todos los miembros de la familia y aplique el tratamiento si fuera necesario.
- Si tras la aplicación correcta del tratamiento (dos aplicaciones) observa que todavía el problema continúa, existen productos alternativos que le deberán recomendar **en la consulta pediátrica.**



Los Piojos



- Son insectos parásitos muy pequeños (2-5 mm) que no saltan ni vuelan.
- Pueden contagiarse con mucha facilidad por compartir peines, cepillos, cintas, gorros o por contacto directo entre cabezas.

- La presencia de piojos produce picor y molestias desagradables.
- La liendre (huevo del piojo) es de color blanco-grisáceo y se pega fuertemente al pelo.
- Se localizan, normalmente, en la nuca y detrás de las orejas.
- Para distinguirlas de la caspa trate de quitarlas, si no pueden sacarse con facilidad probablemente sean liendres.
- La presencia de piojos en los niños y niñas no debe ser motivo de vergüenza y ocultación.

Esquema de tratamiento ante los piojos



Recomendaciones finales


EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS NO SE RECOMIENDA EL USO DE NINGÚN PRODUCTO PEDICULICIDA.

Puede lavar la ropa de cama contaminada, los cepillos, gorros y cintas del pelo en agua caliente (55°C) para eliminar a los parásitos.

Los productos pediculicidas no deben usarse de manera continuada ni con fines preventivos ya que pueden ser perjudiciales. Tampoco se debe mezclar el uso de estos productos simultáneamente.

Los piojos no parasitan a los animales de compañía como perros y gatos y por tanto, estos animales no los transmiten.

Mantener los productos alejados de los menores para evitar su ingestión accidental.



En caso de intoxicación
contacte con el
INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA
91-562-04-20

 Servicio
Canario de la Salud

 Gobierno
de Canarias