Rhynchophorus ferrugineus

Picudo rojo, gorgojo de las palmeras

Catálogo invasoras

Clasificación científica

Metazoa - Arthropoda - Hexapoda - Coleoptera - Curculionidae

Clasificación divulgativa

animales - invertebrados

Descripción técnica

Es un insecto de tamaño grande de cuerpo ovalado que puede llegar a alcanzar los 5 cm de largo, siendo normalmente de entre 19 a 42 mm de largo y de 8 a 16 mm de ancho, con un rostro largo y curvado que en los machos está cubierto por un cepillo de setasu órganos sensitivos en el extremo distal del pico, mientras que en las hembras es liso. El nombre común se debe a la presencia de esta prolongación en la cabeza en forma de pico. El submentón está encorvado. La coloración es variable, desde pardo anaranjado claro a rojo ferruginoso, opaco o brillante, con o sin manchas negras en el pronoto, de forma y número variable (Gesplan, 2008; MITECO, 2013a).

Las puestas tienen un color blanquecino y forma ovalada, de unos 2,6 mm de largo y 1,12 mm de ancho. Las larvas son piriformes, ápodas, blancas o blanco cremoso, con la cápsula cefálica marrón rojizo oscuro; miden hasta 35 mm de largo; su cuerpo está compuesto por 13 segmentos y aparece ligeramente curvado; las piezas bucales están bien desarrolladas y quitinizadas. El capullo es ovalado, de entre 4-6 cm de longitud, formado por fibras de la palmera. Las pupas son de color crema al principio, volviéndose marrones con el tiempo, con la superficie brillante, arrugada y reticulada (MITECO, 2013a).

Fuente: EXOS

Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/A08108)

Galería

4 fotos

Rhynchophorus ferrugineus

José Docoito

Rhynchophorus ferrugineus

Rhynchophorus ferrugineus

Rhynchophorus ferrugineus