

## **NIVELES DE INFANTIL Y PRIMARIA**

### **NOTIFICACIÓN DE LA APARICIÓN DE MÁS DE 4 CASOS CONFIRMADOS DE COVID EN EL AULA DE SU HIJO**

**La Dirección General de Salud Pública siguiendo la estrategia del Ministerio de Sanidad publicada el pasado día 9 de enero, ante la aparición agregada de más de 4 casos confirmados de COVID-19 o afectación de más del 20% de la clase en un periodo de 7 días en los niveles de Infantil o Primaria, le informa lo siguiente e indica pautas a seguir:**

- Se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que los colegios son un lugar seguro siendo la diseminación del virus menor que en otras situaciones de exposición al mismo, dado que se han establecido una serie de medidas para precisamente evitar la difusión de la enfermedad.
- No obstante es posible que debido a la alta circulación del virus que se está produciendo en estos momentos, aparezcan en algunos momentos concentraciones en el tiempo de positivos en un mismo aula, por ello, se ha consensado a nivel nacional que se tomen las siguientes medidas en el momento en que exista una agrupación de 5 o más casos confirmados en la misma aula, o cuando se vea afectada más de un 20% de la misma en un periodo de 7 días

**UNA VEZ QUE SE HA DETECTADO UNA AGRUPACIÓN DE MÁS DE 4 CASOS, O EL AULA TIENE A MÁS DE UN 20% DE AFECTADOS EN UN PERIODO DE 7 DÍAS, SE DEBERÁN SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:**

#### **1.- NIÑOS NO VACUNADOS O CON PAUTA INCOMPLETA (1 sola dosis)**

- Si su hijo **NO** está vacunado o no tiene la pauta completa (2 dosis), **DEBERÁ** guardar **cuarentena domiciliaria** durante los 7 días siguientes al último día en que coincidió con el último caso positivo en clase y por lo tanto **NO DEBERÁ enviarlo al colegio**.
- De momento y hasta que se consiga un nivel alto de vacunación en las edades de infantil y primaria, probablemente será la totalidad de la clase la que tenga que hacer cuarentena domiciliaria.
- Durante el periodo de cuarentena en casa (7 días) debe vigilar la salud de su hijo y extremar las medidas de seguridad e higiene, especialmente tenga en cuenta la ventilación de la casa.
- Es importante que evite en lo posible las interacciones con otras personas convivientes y las visitas. Preferiblemente deberá estar en una habitación de uso individual. Si no fuera posible debe utilizar siempre mascarilla en las zonas comunes y en la interacción con otras personas.

- Una vez terminada la cuarentena de 7 días, deberá seguir pendiente de la posible aparición de síntomas y deberá reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación vigente durante **3 días más**, es decir, hasta el décimo día posterior a la última vez que coincidió en clase con el caso positivo.
- Durante este tiempo de 10 días, deberá evitar especialmente el contacto con personas vulnerables<sup>1</sup> (Personas inmunodeprimidas<sup>2</sup>, mayores de 70 años y embarazadas).
- Debe mostrarse siempre alerta ante la aparición de síntomas y en ese caso aísle al niño y contacte con el sistema sanitario mediante la línea 900-112-061.

## **2.- NIÑOS COMPLETAMENTE VACUNADOS (2 dosis)**

- Si su hijo está correctamente vacunado para su edad, **está exento** de realizar cuarentena domiciliaria. El colegio valorará la capacidad de impartir clases presenciales o no, dependiendo de sus posibilidades.
- ESTA SITUACIÓN **NO EXIME DE QUE**, durante los **10 días** posteriores a la última exposición al caso positivo, debe vigilar el estado de salud del mismo y extremar las medidas de seguridad, reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas vulnerables.
- Ante la aparición de síntomas compatibles **NO ENVÍE** al niño a clase, aíslelo y contacte con el sistema sanitario a través de la línea 900-112-061.

---

### 1 Personas Vulnerables

- Inmunodeprimidos
- Mayores de 70 años
- Embarazadas

### 2 Personas Inmunodeprimidas

- Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita
- Tratamiento con inmunosupresores
- Trasplante de médula ósea en los últimos 2 años
- Trasplante de órganos o en lista de espera para trasplante
- Diálisis
- Enfermedad oncológica en los últimos 5 años o no controlada Infección con VIH
- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o enfermo renal crónico )