



**SERVICIO CANARIO DE LA SALUD**

\_\_\_\_\_

APELLIDOS, NOMBRE

\_\_\_\_\_

D.N.I.

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA DE LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.**

Resolución de 16 de marzo de 2010 (B.O.C. de 19 de marzo)

**Categoría: F.E.A. PSICOLOGÍA CLÍNICA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **3 horas**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.-Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la "resiliencia"
  - A) Se conoce desde los años setenta, y se inspiró en el concepto de la física
  - B) El etólogo Boris Cyrulnik la observó en algunos supervivientes de campos de concentración entre otros
  - C) Se trata de una nueva terapia de orientación psicoanalítica
  - D) Michael Rutter fué quien introdujo el término aplicándolo a la psicología
- 2.- La teoría del doble vínculo revistió especial importancia para:
  - A) La teoría del apego.
  - B) Los neofreudianos.
  - C) La terapia familiar.
  - D) La escuela psicoanalítica inglesa.
- 3.- El subtest de Aritmética del WISC-R es una medida de conocimientos escolares y contribuye al factor de Independencia a la distracción junto con los subtests de:
  - A) Dígitos y Figuras Incompletas
  - B) Claves y Cubos
  - C) Claves y Rompecabezas
  - D) Dígitos y Claves
- 4.- Los Centros de Día de rehabilitación psicosocial en Salud Mental se han diseñado para una población diana definida como:
  - A) Personas con trastornos mentales
  - B) Personas con trastornos mentales graves y duraderos
  - C) Personas con trastornos mentales en edad infanto-juvenil
  - D) Personas con trastornos mentales de estructura neurótica
- 5.- Cual de los criterios siguientes permite hacer el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo y anorexia nerviosa:
  - A) En el trastorno depresivo mayor el paciente no desea adelgazar ni tiene miedo a ganar peso.
  - B) En la depresión se aumenta de peso.
  - C) No hay acuerdo de criterios entre los autores.
  - D) En la depresión se desea perder peso lentamente.
- 6.- El retraso mental tiene una evolución y un pronóstico caracterizado por:
  - A) Las personas con retraso mental leve o moderado tienen mayores dificultades de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno.
  - B) El pronóstico global depende de las alteraciones mentales comórbidas existentes.
  - C) El tratamiento de las alteraciones mentales comórbidas no son eficaces.
  - D) El déficit intelectual subyacente mejora con la edad.
- 7.- La subescala Pd2 , de Harris y Lingoes, del MMPI hace referencia a:
  - A) Experiencias sensoriales extrañas.
  - B) Depresión subjetiva.
  - C) Problemas con la autoridad.
  - D) Quejas somáticas.
- 8.- La edad psicológica de una persona es un concepto que alude a:
  - A) El índice temporal referido a la fecha de nacimiento del individuo.
  - B) El estado morfo-funcional de su organismo.
  - C) La capacidad de adaptarse con éxito a las exigencias del ambiente en distintos periodos del desarrollo.
  - D) El grado de ajuste entre el rol social que desempeña y las expectativas sociales correspondientes a su edad cronológica.

- 9.- Dentro de los programas de rehabilitación psicosocial, la evaluación de las habilidades sociales debe identificar:
- A) Habilidades que no están presentes en el repertorio del sujeto
  - B) Habilidades que el sujeto tiene adquiridas pero que no ejecuta
  - C) Habilidades sociales que se manifiestan de manera eficaz y pueden ser útiles para el reforzamiento de otras conductas de interacción personal.
  - D) Las tres preguntas anteriores son correctas
- 10.- ¿Cuál es una característica común de los trastornos de la personalidad?
- A) La rigidez.
  - B) El psicoticismo.
  - C) La disforia.
  - D) La baja autoestima.
- 11.- De los trastornos de ansiedad que se indican a continuación y que suelen diagnosticarse en los niños y adolescentes ¿cuál suele iniciarse a edades más tardías?:
- A) Fobia social.
  - B) Trastorno de ansiedad de separación.
  - C) Fobia a la oscuridad.
  - D) Fobia a la sangre.
- 12.- Para Piaget la función simbólica aparece:
- A) Hacia finales del segundo año de vida
  - B) Hacia finales del tercer años de vida
  - C) Hacia finales del cuarto año de vida
  - D) En la adolescencia
- 13.- Un tratamiento conductual de la ansiedad es
- A) la Terapia de autococontrol de Rehm
  - B) Deprivación conductual y reentrenamiento
  - C) Proyección en el tiempo con refuerzo positivo
  - D) La Inundación
- 14.- Según el Programa de Atención a la Salud Mental Infanto juvenil de la Comunidad de Canarias dentro de los criterios de priorización de las intervenciones en la U.S.M.C. se incluyen: ...
- A) Las alteraciones conductuales (TDA Y TDAH, Trastornos de la Conducta y Trastorno oposicionista desafiante)
  - B) Los trastornos adaptativos, secundarios a cambios en el entorno
  - C) Los trastornos del aprendizaje
  - D) Enuresis secundaria
- 15.- La prevención de recaídas:
- A) Es una re-evaluación de la Terapia Conductual.
  - B) Se usa en pacientes que precisan una seguridad psicológica.
  - C) Es un programa de autocontrol para ayudar a los pacientes a anticipar y afrontar sus adicciones.
  - D) Es una técnica que se basa en la teoría del Apego.
- 16.- Las pseudoalucinaciones:
- A) Conllevan convicción de realidad
  - B) Se dan en el espacio subjetivo interno
  - C) Se dan básicamente en las modalidades táctil y cenestésica
  - D) Dependen de estados de deprivación sensorial

- 17.- ¿Cómo se denomina el dispositivo definido a continuación: Dispositivos que ofrecen programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración, así como actividades de apoyo social para ayudar a las personas con una enfermedad mental grave y crónica a recuperar el máximo de autonomía personal y social, mejorar su funcionamiento psicosocial y promover su mantenimiento e integración en la comunidad. Así mismo ofrecen psicoeducación, asesoramiento y apoyo a las familias
- A) Centro de Día
  - B) Hospital de Día de adultos
  - C) Centro de Rehabilitación Psicosocial
  - D) Unidad Hospitalaria de Rehabilitación
- 18.- Un castigo es menos eficaz cuanto:
- A) Más demorado sea desde la emisión de la conducta negativa
  - B) Más intenso sea el castigo
  - C) Mas se aplique de manera consistente
  - D) Mas duración tenga el estímulo aversivo
- 19.- Cuando Winnicott utiliza el término "madre" de un bebé recién nacido, se refiere a:
- A) Única y exclusivamente a la madre.
  - B) A la madre y al padre como figuras indistintas.
  - C) A la madre y a los aspectos maternales del padre.
  - D) A la simbiosis entre la madre y el bebé.
- 20.- La frase el inconsciente está estructurado como un lenguaje, se atribuye a.
- A) Freud
  - B) Lacan
  - C) Jung
  - D) M. Klein
- 21.- El planteamiento de las preocupaciones como respuestas de evitación cognitiva en la ansiedad generalizada supone
- A) Que el objetivo del tratamiento sea evitar la preocupación
  - B) Que el sujeto evita exponerse a las situaciones de preocupación
  - C) Que al sujeto le cuesta afrontar los problemas
  - D) Que el sujeto parte del esquema de que preocuparse mucho le va a permitir evitar el posible desastre
- 22.- En cuál de los siguientes trastornos clínicos está indicado el tratamiento farmacológico con Litio, tanto en la fase aguda como de mantenimiento, por presentar los mejores resultados:
- A) Trastorno depresivo mayor
  - B) Trastorno bipolar
  - C) Trastorno disociativo
  - D) Trastorno adaptativo
- 23.- En el Test de Apercepción Temática de Murria (TAT) los estímulos que se presentan al sujeto:
- A) Son fragmentos escritos con historias incompletas
  - B) Están desestructurados
  - C) Son el dibujo de la casa y el árbol.
  - D) Están muy estructurados
- 24.- Los logros más importantes de la inteligencia sensoriomotriz son:
- A) Intencionalidad y permanencia del objeto.
  - B) Reversibilidad e intencionalidad.
  - C) Reversibilidad y combinatoria.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 25.- En un diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y paranoia, ¿qué característica es significativa?
- A) El sexo
  - B) La clase social
  - C) La evolución deteriorante
  - D) La forma de inicio

- 26.- Se considera una variable disfuncional del Terapeuta que repercute en la eficacia de la psicoterapia
- A) La curiosidad sobre sí mismo e interés natural por la gente.
  - B) El deseo de poder.
  - C) La capacidad introspectiva.
  - D) La tolerancia a la frustración y a la ambigüedad.
- 27.- La enfermedad de Parkinson se produce por un deterioro en la síntesis, liberación y transmisión de:
- A) Acetilcolina
  - B) Dopamina
  - C) GABA
  - D) Serotonina
- 28.- El Trastorno negativista desafiante:
- A) La autoestima no está alterada
  - B) La prevalencia es mayor en mujeres
  - C) Se asocia a menudo a TDHA, Trastorno del aprendizaje
  - D) No se asocia a TDHA, ni a Trastorno del aprendizaje ya que acusa a los otros de sus errores y mal comportamiento.
- 29.- Las circunstancias de la concepción y embarazo como fallecimientos de familiares directos, conductas de riesgo por parte de la madre, situaciones críticas laborales, se consideran:
- A) Un factor de riesgo que comporta una mayor posibilidad de trastorno psicopatológico en el niño
  - B) No tiene importancia alguna
  - C) Una señal de alerta
  - D) Determina indudablemente el desarrollo de un trastorno psicopatológico en la infancia
- 30.- ¿El fenómeno Déjà vu es una alteración de?
- A) Lenguaje.
  - B) Pensamiento.
  - C) Memoria.
  - D) Atención
- 31.- El Trastorno generalizado del desarrollo con inicio más precoz es el Autismo.
- A) Efectivamente porque su inicio es brusco.
  - B) Porque no hay patología congénita asociadas.
  - C) El perfil cognitivo es por encima de la media de los niños de su edad.
  - D) Un 75% presenta Retraso Mental y un 25% crisis convulsivas.
- 32.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ansiedad no patológica y ansiedad generalizada?
- A) En la ansiedad generalizada no hay tantas manifestaciones somáticas.
  - B) En la ansiedad no patológica no hay manifestaciones somáticas.
  - C) En la ansiedad generalizada las preocupaciones pueden aparecer sin factores desencadenantes.
  - D) Ninguna de las anteriores es cierta
- 33.- La calidad de vida en personas con trastorno mentales graves se ve afectada principalmente por
- A) Psicopatología general, especialmente depresión y ansiedad
  - B) Red social
  - C) Autoestima
  - D) Las tres respuestas anteriores son correctas
- 34.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a las técnicas de Mindfulness?
- A) Pertenecen al grupo denominado segunda generación de las terapias de conducta.
  - B) Aún no se ha conseguido integrar plenamente con las terapias cognitivas.
  - C) Consiste básicamente en prestar atención a los pensamientos en estado de calma para evitar el sufrimiento.
  - D) Se utiliza para el manejo del estrés.

- 35.- El término de pseudodemencia delimita un cuadro caracterizado por:
- A) Síntomas semejantes a los de la demencia que se presentan en algunos pacientes que padecen depresión
  - B) Ser una demencia que evoluciona favorablemente
  - C) Síntomas depresivos en pacientes con demencia
  - D) Simulación de deterioro cognitivo
- 36.- Algunas conductas del trastorno de identidad disociativo puede justificar el diagnóstico de:
- A) Trastorno histriónico de la personalidad.
  - B) Trastorno esquizotípico de la personalidad.
  - C) Trastorno narcisista de la personalidad.
  - D) Trastorno límite de la personalidad.
- 37.- La función principal de un Centro de rehabilitación Psicosocial es
- A) La recuperación de habilidades y roles sociales
  - B) La realización de talleres ocupacionales
  - C) El control de los síntomas
  - D) Contención y apoyo socio-familiar
- 38.- Para diagnosticar un Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia, según la CIE 10:
- A) El grado de ansiedad debe ser clínicamente anormal
  - B) El comienzo debe darse antes de los 2 años
  - C) La ansiedad puede formar parte de un trastorno mas amplio
  - D) No existe este diagnóstico
- 39.- ¿Cuál de las siguientes estrategias o conductas observables está hiperdesarrollada, según Beck, en el trastorno narcisista de la personalidad?:
- A) Desconfianza
  - B) Exhibicionismo
  - C) Combatividad
  - D) Competitividad
- 40.- En relación al delirio, cual de estas características es falsa:
- A) Creencia falsa
  - B) Mantenido firmemente
  - C) Compartida por el resto del entorno cultural del que delira
  - D) Es irreductible a cualquier argumentación lógica
- 41.- Según la CIE 10 una de las diferencias entre un autismo atípico y un autismo infantil consiste en:
- A) Que en el primero se da un progresivo deterioro físico
  - B) El primero comienza después de los tres años
  - C) No hay diferencias diagnósticas entre ambos trastornos
  - D) El primero no pertenece a la categoría de Trastornos Generalizados del desarrollo
- 42.- Según Bordin (1979), ¿cuál de los siguientes aspectos constituye un componente fundamental de la alianza terapéutica?:
- A) La capacidad de confrontación del terapeuta.
  - B) El vínculo entre cliente y terapeuta.
  - C) El tipo de psicoterapia
  - D) Las técnicas concretas utilizadas en el tratamiento.
- 43.- ¿Cual es la regla básica de la técnica psicoanalítica?
- A) La atención flotante
  - B) La de abstinencia
  - C) La asociación libre
  - D) La neutralidad
- 44.- La tangencialidad hace referencia a:
- A) Respuestas oblicuas y/o irrelevantes
  - B) Discurso descarrilado o fuga de ideas
  - C) Respuestas con monosílabos
  - D) Discurso pomposo y poco creible

- 45.- En relación a la evaluación de la inteligencia ¿Qué autor destaca?:
- A) Wolpe con su escala manipulativa que constituye el coeficiente de desviación
  - B) Watson y Friend con su escala verbal que se ha generalizado a partir de ahí el coeficiente de desviación
  - C) Mary Corver Jones y su escala de inteligencia por su aportación del coeficiente de desviación
  - D) Weschler con su escala que crea el coeficiente de desviación, es decir las puntuaciones directas se transforman en puntuaciones típicas comparando su rendimiento con los de su edad
- 46.- El principal afecto ligado al instinto de vida es para M. Klein:
- A) La envidia.
  - B) Los celos.
  - C) La gratitud.
  - D) La satisfacción.
- 47.- Los síntomas psicóticos congruentes con estado de ánimo depresivo, incluyen ideas delirantes del tipo:
- A) Culpa y merecimiento de castigo
  - B) Inserción de pensamiento
  - C) Ideas delirantes de control
  - D) Ideas de persecución
- 48.- En el modelo dialectico conductual de Linehan, si el paciente ha realizado un acto parasuicida y su vida no corre peligro, no podrá contactar con su terapeuta hasta :
- A) Pasadas 48 horas
  - B) Hasta la próxima sesión
  - C) Pasadas 24 horas
  - D) No existe ninguna regla al respecto
- 49.- En el tratamiento de la Esquizofrenia el tipo de intervención que se ha demostrado más eficaz hasta el momento es:
- A) El entrenamiento en habilidades sociales combinado con medicación neuroléptica.
  - B) La terapia familiar de tipo psicoeducativo encaminada a reducir la tasa de emoción expresada, en combinación con medicación neuroléptica.
  - C) El uso de medicación neuroléptica atípica depot.
  - D) El programa STEPS de Gunderson combinado con medicación neuroléptica depot.
- 50.- ¿Cómo diferenciamos un síndrome amnésico de un cuadro demencial en un paciente que se queja con reiteración sobre su memoria?:
- A) Por la presencia de amnesia retrograda.
  - B) Por la presencia de amnesia anterograda.
  - C) Por la presencia de deterioro cognitivo global que progresa a medida que avanza el trastorno.
  - D) Por la edad del paciente.
- 51.- ¿Cual de estas medidas, no constituye una medida de tendencia central?
- A) Moda
  - B) Mediana
  - C) Media
  - D) Desviación Típica
- 52.- Según la teoría de los neurotransmisores , la depresión se relacionaría con un déficit de:
- A) Dopamina.
  - B) Serotonina.
  - C) Noradrenalina.
  - D) Glándula tiroidea.

- 53.- La obnubilación de la conciencia, el estado confusional, alucinaciones e ilusiones vividas en cualquier modalidad sensorial y temblor intenso, es propia de:
- A) Trastorno de pánico.
  - B) Trastorno histérico de la personalidad.
  - C) Síndrome de Abstinencia con Delirium.
  - D) Síndrome de Gánser.
- 54.- La detección precoz de los trastornos psicopatológicos de los niños y adolescentes está al alcance, casi en exclusiva y por pura definición:
- A) De la Red de Servicios Sociales
  - B) De los Equipos de Orientación escolares
  - C) De los pediatras de Atención Primaria
  - D) Del entorno sociofamiliar
- 55.- En relación con las habilidades básicas de entrevista en rehabilitación psicosocial, el concepto de "yo observador" se refiere a:
- A) Las respuestas experimentadas por el propio entrevistador
  - B) Las habilidades que acompañan y guían la entrevista
  - C) Las habilidades que facilitan la actividad narrativa
  - D) Las habilidades que facilitan el cambio de narrativa
- 56.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
- A) El paciente con trastorno esquizoide de la personalidad se considera a sí mismo socialmente inepto
  - B) El paciente con trastorno evitativo de la personalidad sufre por la crítica
  - C) El paciente con trastorno esquizoide de personalidad no está satisfecho con su poca participación social
  - D) El paciente con trastorno evitativo de la personalidad no desea tener amistades
- 57.- Una de las principales aportaciones de Spitz sobre el desarrollo del niño es:
- A) La diferenciación entre posición esquizo-paranoide y depresiva
  - B) La importancia de los mecanismos de defensa en el desarrollo de la personalidad del niño
  - C) La importancia de las figuras de apego en el desarrollo humano y las consecuencias que conlleva la separación de las mismas
  - D) La diferenciación entre pecho bueno y pecho malo
- 58.- ¿Cómo se denomina el dispositivo definido a continuación: dispositivos que ofrecen programas y actividades de apoyo y soporte social, para ayudar a las personas con enfermedad mental grave y crónica con mayores niveles de dificultades de funcionamiento, aislamiento y dependencia, a alcanzar un mínimo de autonomía y apoyar su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles?
- A) Centro de Día de soporte social
  - B) Hospital de Día de adultos
  - C) Centro de Rehabilitación Psicosocial
  - D) Unidad Hospitalaria de Rehabilitación
- 59.- El síndrome neuroléptico maligno
- A) Es provocado por la abstinencia prolongada de alcohol
  - B) Se corrige farmacológicamente con antipsicóticos
  - C) Es un efecto secundario grave de los antipsicóticos, similar a la catatonía
  - D) Provoca alucinaciones de contenido místico
- 60.- Se consideran factores de riesgo aumentado en el intento de suicidio en adolescentes
- A) absentismo escolar
  - B) trastorno de personalidad obsesiva
  - C) trastornos del humor, trastornos de la identidad sexual, víctimas de abuso sexual
  - D) ataque de pánico en varones



- 61.- Desde la Teoría del Apego ¿qué necesidad prevalece sobre todas las demás?
- A) Necesidades fisiológicas.
  - B) Necesidad de autonomía.
  - C) Necesidad de actividad física.
  - D) Necesidad de establecer vínculos afectivos.
- 62.- En las personas con trastorno mental grave el tratamiento cognitivo conductual se puede utilizar combinado con tratamiento estándar, para
- A) Disminuir la sintomatología positiva fundamentalmente las alucinaciones
  - B) Mejorar el funcionamiento social
  - C) Mejorar la sintomatología positiva resistente
  - D) Las tres respuestas anteriores son correctas
- 63.- ¿En cuál de los siguientes trastornos, el riesgo de suicidio es más elevado?:
- A) Esquizofrenia.
  - B) Depresión mayor.
  - C) Trastorno bipolar.
  - D) Trastorno distímico.
- 64.- Podemos hablar de un Retraso mental Leve cuando el paciente
- A) Tiene un C.I. entre 50 y 69 según el CIE-10
  - B) CI de 45 en algunos casos puede considerarse retraso mental leve
  - C) Depende si le han administrado test proyectivos o no proyectivos
  - D) Depende si acude a aula de Pedagogía terapéutica o si está integrado
- 65.- Un componente paralingüístico de la habilidad social es:
- A) La latencia: el intervalo temporal de silencio entre la terminación de una oración y el comienzo de otra oración.
  - B) Los gestos
  - C) El tono y la inflexión
  - D) Las respuestas "a" y "c" son correctas
- 66.- ¿Cuál es la concepción de los demás ( los demás son....) que tienen los sujetos con trastorno obsesivo de la personalidad?:
- A) Críticos
  - B) Exigentes
  - C) Autocomplacientes
  - D) Inferiores
- 67.- ¿Cuál de las siguientes escalas clínicas del MMPI suele estar elevada en el trastorno de personalidad esquizoide?
- A) La escala 4
  - B) La escala 0
  - C) La escala 9
  - D) La escala 5
- 68.- ¿Cuál de las escalas clínicas del MMPI mide ansiedad y rasgos obsesivos compulsivos?
- A) Psicastenia
  - B) Paranoia
  - C) Depresión
  - D) Introversión social
- 69.- Según el DSM-IV-TR los Trastornos bipolares implican la presencia o historia de:
- A) Episodios maníacos acompañados por episodios depresivos de forma alternativa.
  - B) Episodios maníacos, mixtos o hipomaniacos normalmente acompañados por la presencia o historia de episodios depresivos mayores
  - C) Episodios maníacos o hipomaniacos
  - D) Episodios maníacos o depresivos recurrentes

- 70.- La sensación de acortamiento del futuro se observa en:
- A) Depresión
  - B) Fobia social
  - C) Trastorno de estrés postraumático
  - D) Esquizofrenia
- 71.- Diferencias entre sexos en la depresión infantil:
- A) las depresiones en varones suelen ser más graves, más precoces y con más trastornos de conducta
  - B) En las depresiones en varones suelen predominar los trastornos ansiosos previos
  - C) En las depresiones en varones predominan los trastornos ansioso previos
  - D) En las depresiones en varones predomina el aislamiento pero suelen ser menos graves que en las niñas
- 72.- En la histeria, ¿qué mecanismo de defensa está implicado?
- A) La negación
  - B) El aislamiento
  - C) La formación reactiva
  - D) La represión
- 73.- La inducción de sensación de calor y pesadez es característico de un tipo de relajación. Señale la correcta
- A) Meditación
  - B) Relajación condicionada
  - C) Entrenamiento autógeno
  - D) Entrenamiento en respiración lenta
- 74.- La prueba de dígitos del WAIS evalúa entre otras cosas:
- A) Abstracción
  - B) Praxias
  - C) Memoria auditiva inmediata
  - D) Memoria a largo plazo
- 75.- Cuando el miedo y la evitación están asociados a estímulos más o menos específicos (objetos, personas, sensaciones, actividades, situaciones, etc.), nos referimos a:
- A) El trastorno de pánico
  - B) La agorafobia
  - C) El trastorno de ansiedad generalizada.
  - D) Los trastornos fóbicos.
- 76.- La incapacidad para experimentar placer se designa:
- A) Tristeza
  - B) Anhedonia
  - C) Labilidad emocional
  - D) Inadecuación afectiva
- 77.- La clínica de los trastornos afectivos en el anciano, frente a los no ancianos, se caracteriza por:
- A) Expresión de ánimo triste.
  - B) No hay diferencias en las manifestaciones clínicas de la depresión en el anciano
  - C) Ningún componente paranoide asociado.
  - D) Más presencia de síntomas vegetativos.
- 78.- Un dispositivo sanitario de carácter hospitalario diseñado para cumplir funciones integradas de tratamiento, rehabilitación y contención. ¿De qué dispositivo se trata?
- A) Centro de Día
  - B) Hospital de Día de adultos
  - C) Centro de Rehabilitación Psicosocial
  - D) Unidad Hospitalaria de Rehabilitación

- 79.- Una vez que se han verificado que se cumplen los criterios para el diagnóstico de discapacidad intelectual (retraso mental), un C.I. global de 62 indicaría:
- A) Retraso mental moderado
  - B) Retraso mental leve
  - C) Retraso mental límite
  - D) Retraso mental sin especificación
- 80.- El término de pseudodemencia delimita un cuadro caracterizado por:
- A) Síntomas semejantes a los de la demencia que se presentan en algunos pacientes que padecen depresión
  - B) Ser una demencia que evoluciona favorablemente.
  - C) Síntomas depresivos en pacientes con demencia
  - D) Simulación de deterioro cognitivo
- 81.- En un diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y paranoia , ¿ qué característica es significativa ?
- A) El sexo
  - B) La clase social
  - C) La evolución deteriorante
  - D) La forma de inicio
- 82.- Señala la respuesta correcta:
- A) Los trastornos adaptativos pueden dar lugar a la aparición de enfermedades físicas.
  - B) Los trastornos adaptativos pueden complicar la evolución de una enfermedad física.
  - C) Se ha demostrado que no existe de los trastornos adaptativos en la salud física.
  - D) Todas son falsas.
- 83.- ¿En cuál de los siguientes trastornos psicológicos diversos autores recomiendan el formato de terapia grupal debido a que, por diversas razones, el elemento grupo ya se considera en sí mismo terapéutico?
- A) Hipocondría
  - B) Fobias específicas
  - C) Fobia social
  - D) Trastorno de ansiedad generalizada
- 84.- El entrenamiento autoinstruccional se aplica con éxito
- A) En pacientes con C.I. alto
  - B) Se ha demostrado que es exitoso en pacientes paranoides
  - C) A pacientes con Hiperactividad e impulsividad
  - D) Solo en pacientes adultos con capacidad de introspección
- 85.- ¿Qué trastornos mentales tienen como síntoma habitual alteraciones del sueño?
- A) Depresión y trastornos bipolares
  - B) Esquizofrenia simple
  - C) Trastorno límite de la personalidad
  - D) Trastorno negativista desafiante
- 86.- ¿Qué tipo de alteración tiene un paciente que nos dice que su cuerpo ha cambiado de forma y tamaño?:
- A) Idea delirante primaria
  - B) Alucinación visual.
  - C) Idea obsesiva.
  - D) Alucinación cenestésica.
- 87.- El estrés psicosocial asociado a situaciones laborales se relaciona más específicamente con:
- A) Aparición de enfermedad coronaria.
  - B) Aparición de enfermedades infecciosas.
  - C) Aparición de cáncer.
  - D) Aparición de diabetes.

- 88.- ¿Cuál de las siguientes escalas clínicas del MMPI suele estar elevada , además de la escala 2, en el trastorno de personalidad depresiva, si existen problemas de autodestructividad y agitación, según Millon?
- A) La escala 4.
  - B) La escala 8.
  - C) La escala 3.
  - D) La escala 6.
- 89.- ¿Qué pionero de la terapia familiar comenzó a realizar entrevistas familiares conjuntas para el tratamiento de problemas infantiles?:
- A) Simon Stierlin.
  - B) Milton H. Erickson.
  - C) Gregory Bateson.
  - D) Nathan Ackerman.
- 90.- En un ataque de pánico:
- A) Los síntomas aparecen bruscamente
  - B) Aparecen respuestas fisiológicas normales
  - C) La persona que lo padece tiene otras patologías asociadas
  - D) Se presenta siempre cuando el paciente está solo
- 91.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la aplicación de las técnicas de Mindfulness?:
- A) Tratan de controlar el malestar con la atención plena a los sentimientos y pensamientos
  - B) El objetivo consiste en adquirir un mayor control de las reacciones, emociones y sentimientos
  - C) Se utilizan para elegir de forma activa en que situaciones implicarse
  - D) Una de las técnicas que se utiliza en Mindfulness se denomina "body scan"
- 92.- Las alucinaciones en los procesos orgánicos tienden a ser
- A) Complejas
  - B) Auditivas
  - C) Menos complejas
  - D) Cenestésicas
- 93.- El instrumento de evaluación WHOQOL elaborado por la OMS se dirige a:
- A) Evaluar estado de salud y psicopatología
  - B) Evaluar la calidad de vida percibida por el sujeto
  - C) Evaluar psicopatología general y funcionamiento
  - D) Las tres respuestas anteriores son ciertas
- 94.- Criterios de ingreso hospitalario en los Trastornos de la Conducta Alimentaria
- A) Pérdida ponderal grave IMC inferior a 15 en mayores de 14 años o pérdida de peso superior al 20-25%
  - B) Índice de Masa corporal inferior a 20
  - C) Pérdida de peso superior al 10% con restricción alimentaria
  - D) Restricción alimentaria sin control médico con mareos y alteraciones menstruales.
- 95.- ¿A qué disfunción sexual está asociado el síntoma del dolor en la respuesta sexual?:
- A) Trastorno orgásmico femenino
  - B) Eyaculación retardada
  - C) Disfunción eréctil
  - D) Dispareunia
- 96.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al Trastorno Facticio:
- A) Es un trastorno muy frecuente, y la finalidad queda clara para el observador
  - B) Se incluye en dicho trastorno el Síndrome de Münchhausen
  - C) El paciente acude voluntariamente y con frecuencia persigue la intervención quirúrgica
  - D) Existe el trastorno facticio por poderes

- 97.- ¿Que modalidad de juego aparece a partir de los cuatro años?
- A) De reglas.
  - B) De roles.
  - C) Educativos.
  - D) La A y C.
- 98.- Una de las inferencias basicas de la terapia Racional Emotiva de Ellis es:
- A) Las Tecnicas Humoristicas.
  - B) Escuchar y debatir grabaciones
  - C) Los elementos de vulnerabilidad
  - D) La tendencia del paciente a resaltar solo lo negativo de una situación.
- 99.- Las escalas de la primera forma del MMPI (Hathaway y McKinley, 1943) son:
- A) Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo.
  - B) Hipocondría, Depresión, Histeria, Desviación Psicopática, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia e Hipomanía.
  - C) Dominancia, Empatía, Histeria, Feminidad/ Masculinidad y Tolerancia
  - D) Ansiedad, Depresión, Altruismo, Gregarismo, Asertividad, Hostilidad, Competencia e Impulsividad.
- 100.- ¿Qué nombre recibe "Un dispositivo sanitario específico para personas con trastornos mentales graves que ofrece tratamiento intensivo en régimen de hospitalización parcial, destinado a promover un cambio en el funcionamiento psicológico que permita la continuidad de seguimiento y tratamiento ambulatorio por su Equipo de Salud Mental"?
- A) Centro de Día
  - B) Hospital de Día de adultos
  - C) Centro de Rehabilitación Psicosocial
  - D) Unidad hospitalaria de rehabilitación
- 101.- Un peso dentro de la normalidad es habitual en:
- A) La anorexia tipo bulímico
  - B) El trastorno alimentario sin especificación
  - C) La anorexia restrictiva
  - D) La bulimia
- 102.- ¿Cómo se denomina la experiencia subjetiva de irrealidad o extrañeza con respecto a uno mismo, que lleva a la persona a sentirse como un actor en un escenario o como un espectador de sí mismo?
- A) Delirio de Sosias
  - B) Despersonalización
  - C) Experiencia delirante de congruencia
  - D) Delirio de pasividad
- 103.- El trastorno del pensamiento denominado "tangencialidad" se caracteriza por:
- A) El paciente se para en medio de una frase o idea y cambia de tema.
  - B) Respuestas oblicuas o irrelevantes respecto a lo que se le pregunta.
  - C) Lenguaje incoherente
  - D) Pobreza en la expresión verbal
- 104.- Se entiende por señal de alerta psicopatológica en la población infanto-juvenil:
- A) Aquellos factores que predisponen a padecer un trastorno psicopatológico
  - B) Aquellos factores que se relacionan con la ausencia de psicopatología
  - C) Aquel signo, síntoma o conjunto de manifestaciones que, de acuerdo a la edad de aparición, hacen pensar inmediatamente en una posibilidad de psicopatología
  - D) Ninguno de los anteriores
- 105.- De entre los discípulos de Freud ¿quién desarrolló el psicoanálisis para niños?
- A) S. Ferenczi
  - B) K. Abraham
  - C) F. Alexander
  - D) M. Klein

- 106.-** ¿Cuál es la definición de Trastorno Mental Grave más reconocida?
- A) El paciente debe haber sufrido al menos un episodio depresivo.
  - B) La afectación moderada o severa del funcionamiento laboral, social y familiar, con afectación grave en el funcionamiento y competencia social.
  - C) El paciente con esquizofrenia.
  - D) Todos los trastornos psicóticos de etiología orgánica.
- 107.-** Según la teoría psicoanalítica el mecanismo de defensa que se asocia o relaciona con la depresión es:
- A) Introyección.
  - B) Identificación proyectiva.
  - C) Regresión.
  - D) Negación.
- 108.-** La disminución ó desaparición de la capacidad de obtener placer de actividades o circunstancias que con anterioridad sí la procuraban, se llama:
- A) Angustia
  - B) Anhedonia
  - C) Labilidad
  - D) Ambivalencia
- 109.-** ¿Como se denomina el tipo de esquizofrenia en el que ha existido en algún momento de la evolución algún episodio psicótico pero en el que en la actualidad, predominan los síntomas negativos.
- A) Hebefrenia
  - B) Residual
  - C) Paranoide
  - D) Reactiva
- 110.-** El trastorno narcisista de la personalidad debe de diferenciarse del:
- A) Trastorno de personalidad por dependencia.
  - B) Trastorno bulímico.
  - C) El juego patológico.
  - D) Episodio maniaco o hipomaniaco.
- 111.-** En los trastornos disociativos:
- A) Los síntomas suelen empeorar con tranquilizantes.
  - B) La memoria a corto plazo está más deteriorada que la memoria a largo plazo.
  - C) Los síntomas fluctúan en relación al estrés.
  - D) Se produce una pérdida de memoria tanto de material relevante como irrelevante para la persona.
- 112.-** Combinando los índices epidemiológicos siguientes: la incidencia, frecuencia, prevalencia, expectativas de riesgo, entre otros, obtenemos:
- A) La tasa de frecuencia
  - B) La cantidad proporcional de afectados en la población
  - C) La morbilidad de la población
  - D) Ninguna es cierta
- 113.-** La función principal de este dispositivo sanitario es posibilitar un proceso terapéutico a través de la utilización de diversas actividades terapéuticas, al tiempo que se reducen y estabilizan los síntomas. ¿De qué dispositivo se trata?
- A) Centro de Día
  - B) Hospital de Día de adultos
  - C) Centro de Rehabilitación Psicosocial
  - D) Centro de Rehabilitación Laboral

- 114.- Según las Guías de Práctica Clínica, en personas con trastornos mentales graves ¿las intervenciones familiares en sus diferentes formatos presentan beneficios frente a la no intervención, u otros tipos de intervención psicosocial?
- A) Si, se recomienda ofrecer intervención familiar como parte del tratamiento
  - B) No hay una clara evidencia de la efectividad de estos tratamientos
  - C) Aunque son tratamiento eficaces, su efectividad no supera la no intervención u otros tipos de intervención psicosocial
  - D) Ninguna de las tres respuestas es correcta
- 115.- ¿Cuál es el tratamiento de elección en el primer abordaje del trastorno bipolar?:
- A) La terapia interpersonal.
  - B) La terapia familiar.
  - C) La terapia cognitiva de Beck.
  - D) El tratamiento farmacológico, especialmente con sales de litio.
- 116.- La Distimia se refiere a:
- A) Un tipo de depresión caracterizado por un curso prolongado.
  - B) Un trastorno del curso del pensamiento.
  - C) Un trastorno del lenguaje.
  - D) Un estado de agitación.
- 117.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al Trastorno Facticio
- A) Es un trastorno muy frecuente, y la finalidad queda clara para el observador
  - B) Se incluye en dicho trastorno el Síndrome de Münchhausen
  - C) El paciente acude voluntariamente y con frecuencia persigue la intervención quirúrgica
  - D) Existe el trastorno facticio por poderes
- 118.- Respecto a las técnicas y procedimientos de evaluación, diagnóstico clínico y tratamiento en infancia y adolescencia:
- A) La farmacoterapia debe ser la principal opción de tratamiento siguiendo el modelo médico-psiquiátrico tradicional
  - B) El principal elemento de diagnóstico deben ser los instrumentos de psicometría
  - C) El tratamiento psicológico debe considerarse en principio como la primera opción de tratamiento, partiendo de la entrevista clínica con el paciente y sin olvidar los datos aportados desde el entorno familiar y escolar
  - D) Las técnicas y procedimientos para concluir un diagnóstico y el tratamiento son idénticos a los utilizados en adultos.
- 119.- ¿Qué teoría organizacional concibe una organización dentro de una relación de interdependencia con su ambiente?
- A) La teoría de las relaciones interpersonales
  - B) La teoría científica del trabajo
  - C) La teoría de sistemas
  - D) La teoría de los grupos humanos
- 120.- Pocos días después de tener su primer hijo, Eva comenzó a manifestar creencias delirantes sobre seres extraños que le enviaban mensajes agresivos contra ella, su esposo o su hijo. Este episodio duró quince días y durante la exploración se constató la ausencia de antecedentes personales de cualquier trastorno mental. ¿Qué diagnóstico podría establecerse en este caso?
- A) Trastorno psicótico compartido
  - B) Trastorno esquizoafectivo.
  - C) Trastorno psicótico breve.
  - D) Trastorno paranoide de la personalidad.
- 121.- Según Piaget, cuando un niño tiende a pensar que los objetos materiales están dotados de rasgos propios de los seres vivos hablamos de:
- A) Animismo
  - B) Egocentrismo
  - C) Artificialismo
  - D) Vitalismo

- 122.- ¿Cual de las siguientes características indica un buen pronóstico en la esquizofrenia?
- A) Inicio temprano.
  - B) Ser soltero, divorciado o viudo.
  - C) Antecedentes de agresión.
  - D) Antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo.
- 123.- Los síntomas negativos de la esquizofrenia deben distinguirse de:
- A) Resultado de un ambiente pobre en estimulación.
  - B) Síntomas depresivos.
  - C) Efectos secundarios de los neurolépticos.
  - D) Las tres son correctas.
- 124.- No debe diagnosticarse de ansiedad por separación aunque tenga síntomas :
- A) Si aparece conjuntamente con un Trastorno Generalizado del desarrollo.
  - B) Si aparece conjuntamente con tics.
  - C) Si aparece conjuntamente con enuresis diurna.
  - D) Si aparece conjuntamente con encopresis.
- 125.- Según Piaget el niño ha adquirido la conservación del objeto plenamente:
- A) A partir de los dos años
  - B) A partir del año y medio
  - C) A partir de los nueve meses
  - D) A partir de los once meses
- 126.- ¿Cómo se denomina la alteración del lenguaje que se da en los cuadros afásicos y que se caracteriza por una dificultad para utilizar correctamente las relaciones gramaticales y sus reglas?
- A) Agrafía.
  - B) Anartria.
  - C) Anomia.
  - D) Agramatismo.
- 127.- El psiquiatra francés Gatián de Clérambault denomina al momento inicial de la psicosis, cuando aparecen sus primeros signos, con el término:
- A) Automatismo mental
  - B) Significación Personal
  - C) Ocurrencia delirante
  - D) Robo de pensamiento
- 128.- El término de esquizofrenia fue propuesto por:
- A) Kraepelin.
  - B) Bleuer.
  - C) Schneider.
  - D) Pinel.
- 129.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos de defensa pertenece al nivel defensivo de inhibiciones mentales (formación de compromiso)?
- A) Distorsión psicótica.
  - B) Fantasía autista.
  - C) Proyección delirante.
  - D) Disociación.
- 130.- La entrevista en la que el entrevistador permite hablar al entrevistado en función de sus propias necesidades, formulando preguntas abiertas, se denomina:
- A) Libre.
  - B) Estructurada.
  - C) Semiestructurada.
  - D) Entrevista diagnóstica.



- 131.- ¿En qué eje del DSM-IV se puede indicar el uso habitual de mecanismos de defensa disfuncionales?
- A) El eje I
  - B) El eje II
  - C) El eje III
  - D) El eje IV
- 132.- ¿Qué autor aportó cuales son las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico y utilizó un método basado en la no-directividad?
- A) Murray
  - B) Perls
  - C) Rogers
  - D) Berne
- 133.- La hiperestesia hace referencia a:
- A) Exceso atencional
  - B) Exceso en la percepción de la intensidad estimular
  - C) Exceso en la percepción del dolor
  - D) Dificultades en el control del dolor
- 134.- En el tratamiento psicoterapéutico con el paciente narcisista, el desafío para el terapeuta consiste en:
- A) Elaborar las heridas narcisistas de la infancia
  - B) Evitar que el paciente finalice la psicoterapia antes de tiempo
  - C) Evitar que el paciente interprete como críticas sus intervenciones
  - D) Impedir que afloren sentimientos hostiles
- 135.- Cuando el miedo y la evitación están asociados a estímulos más o menos específicos (objetos, personas, sensaciones, actividades, situaciones, etc.), nos referimos a:
- A) El trastorno de pánico
  - B) La agorafobia
  - C) El trastorno de ansiedad generalizada
  - D) Los trastornos fóbicos
- 136.- Los adolescentes que han presentado algún intento suicida se diferencian de los que solo han tenido ideación suicida por:
- A) ser más autoexigentes, mas sensibles a los sentimientos de desesperanza e introvertidos y no hablan sobre sus ideas suicidas
  - B) ser poco exigentes y más sensibles a sentimientos de éxito
  - C) ser de familias monoparentales
  - D) Ser de un entorno son problemas psicosociales
- 137.- ¿Cuál es la definición del término "confusión"?
- A) Cuando se tiene una conducta errónea.
  - B) Es sinónimo de ofuscación.
  - C) Se refiere a la incapacidad para distinguir la realidad de lo imaginado.
  - D) Es sinónimo de alucinación.
- 138.- Para que se produzca el condicionamiento clásico de respuestas autonómicas en seres humanos, la conciencia de la contingencia estímulo condicionada-estímulo incondicionada (EC-EI), constituye una:
- A) Condición necesaria
  - B) Condición necesaria, aunque no suficiente
  - C) Condición suficiente
  - D) Condición necesaria solo para la extinción de la respuesta condicionada
- 139.- Entre las drogas ilegales, la más consumida en la población general es:
- A) El cannabis.
  - B) La cocaína.
  - C) Las drogas de síntesis.
  - D) Los opiáceos.

- 140.- La existencia en la infancia de una figura capaz de proporcionar los cuidados necesarios de cada etapa vital y asegurar el desarrollo sano de la personalidad se conceptualiza, según Bowlby, como:
- A) Elección de objeto primario
  - B) Constancia objetal
  - C) Dependencia relacional
  - D) Base segura
- 141.- En relación a la técnica de la silla vacía:
- A) Se utiliza solo en la escuela Gestalt de psicoterapia.
  - B) Durante el diálogo el terapeuta no debe ofrecer sugerencias para su desarrollo.
  - C) El paciente debe situarse siempre en la posición de observador.
  - D) El paciente puede cambiarse de silla y continuar el diálogo.
- 142.- Revivir intensamente una agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de imágenes y recuerdos constantes involuntarios junto con pesadillas, se denomina:
- A) Crisis convulsiva.
  - B) Insomnio.
  - C) Crisis de Pánico.
  - D) Trastorno de estrés postraumático.
- 143.- Criterios de ingreso hospitalario en los Trastornos de la Conducta Alimentaria:
- A) Pérdida ponderal grave IMC inferior a 15 en mayores de 14 años o pérdida de peso superior al 20-25%
  - B) Índice de Masa corporal inferior a 20
  - C) Pérdida de peso superior al 10% con restricción alimentaria
  - D) Restricción alimentaria sin control médico con mareos y alteraciones menstruales
- 144.- ¿Qué autor dentro del psicoanálisis describe el desarrollo psíquico y emocional del bebé a partir de la existencia de la Posición Esquizoparanoide y la Posición depresiva?:
- A) Anna Freud
  - B) Donald Meltzer
  - C) Melanie Klein
  - D) Bruno Bettelheim
- 145.- En relación con las habilidades básicas de entrevista en rehabilitación psicosocial, podríamos afirmar que
- A) La entrevista es un arte. Tiene aspectos creativos y únicos
  - B) La entrevista se realiza a través de la aplicación correcta de una serie de técnicas para obtener entonces una buena entrevista
  - C) Diferentes evaluadores harán diferentes entrevistas, cada entrevista es un sistema único que depende de la interacción irreplicable entre el evaluador y el usuario
  - D) Las respuestas "a" y "c" son correctas
- 146.- En cuanto al diagnóstico diferencial de la enfermedad bipolar en niños y adolescentes debemos descartar en primer lugar, debido al solapamiento de síntomas
- A) Trastornos de ansiedad fóbica
  - B) Forster 2002 propone trastorno de la identidad de género.
  - C) El diagnóstico diferencial de enfermedad bipolar en la edad prepuberal y la adolescencia temprana incluye fundamentalmente el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (Séller 1997)
  - D) Ninguno de los anteriores es cierto
- 147.- En la Fobia Social en niños y adolescentes, hay que plantearse el diagnóstico diferencial con:
- A) Con estrés bio-psico-social.
  - B) Del trastorno de angustia con agorafobia, trastorno de Ansiedad Generalizada y fobias específicas.
  - C) Timidez y estrés bio-psico-social
  - D) Psicosis infantil.

- 148.- "Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro", es un criterio diagnóstico del DSM-IV del trastorno de personalidad:
- A) Antisocial.
  - B) Paranoide.
  - C) Límite.
  - D) Histriónico.
- 149.- ¿La psicoterapia Breve está indicada en?
- A) Las Psicosis.
  - B) Los trastornos neuróticos.
  - C) Los trastornos bipolares.
  - D) Las adicciones.
- 150.- Realizar un viaje repentino e inesperado lejos del hogar o del lugar habitual de trabajo, con incapacidad de recordar el propio pasado, es un síntoma característico de:
- A) La fuga disociativa.
  - B) El síndrome amnésico.
  - C) El síndrome de Korsakoff.
  - D) La alucinosis alcohólica.

### PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- En la Bouffé delirante:
- A) Se evidencia agitación motriz.
  - B) Se observa claridad de conciencia.
  - C) Frecuentemente existen alucinaciones visuales.
  - D) Persisten quejas de tipo psicossomático.
- 152.- Si viene a consulta un niño que tiene trastornos del sueño junto con dolor abdominal o esfínteriano sin causa clara y con conductas o conocimientos sexuales extraños podemos pensar prioritariamente en un diagnóstico de:
- A) simulador
  - B) maltrato físico
  - C) absentismo escolar con problemas sociales
  - D) indicadores de abuso sexual
- 153.- ¿A quién se debe la terapia racional emotiva?
- A) Moreno
  - B) Ellis
  - C) Bion
  - D) Turquet
- 154.- En el Trastorno obsesivo de la personalidad se puede afirmar que los sujetos:
- A) Expresan la ira de forma abierta.
  - B) Son inestables en las relaciones sociales
  - C) Sufren continuamente por las obsesiones y compulsiones
  - D) Se entregan al perfeccionismo
- 155.- ¿Cuál de las siguientes técnicas se atribuye a Lázarus?
- A) Proyección en tiempo y refuerzo positivo
  - B) Terapia de autocontrol
  - C) Contingencia de tiempo-terapéutico
  - D) Refuerzo negativo
- 156.- Un matiz que diferencia los constructos "personalidad" y "temperamento" se refiere a:
- A) La mayor relevancia de los factores biológicos en el caso de la personalidad.
  - B) La primacía del efecto de la socialización en el caso del temperamento.
  - C) El temperamento hace mayor alusión al contenido o propósito de la conducta.
  - D) El temperamento se manifiesta en los primeros años de vida, antes que la personalidad.

- 157.-** El eco del pensamiento se define cómo:
- A)** El paciente oye voces dentro de su cabeza
  - B)** El paciente dice en voz alta su propio pensamiento
  - C)** El paciente oye a otras personas decir lo que piensa
  - D)** El paciente oye sus propios pensamientos expresados en voz alta a medida que los piensa
- 158.-** El término Cociente Intelectual (CI), tal como fue propuesto por L.M. Terman, hace referencia a:
- A)** La Edad Cronológica dividida por la Edad Mental
  - B)** La Edad Mental dividida por Edad Cronológica multiplicando el resultado por 100
  - C)** Edad Mental menos la Edad Cronológica
  - D)** La Edad Cronológica dividida por la Edad Mental multiplicando el resultado por 100
- 159.-** ¿ Qué se entiende por terapia de redes sociales?:
- A)** Uno o varios terapeutas trabajan con un grupo de pacientes que sufren un mismo tipo de problema con objeto de que creen redes de autoayuda.
  - B)** Uno o varios terapeutas trabajan con un amplio grupo de personas que suele incluir al paciente, su familia y representantes de instituciones que trabajan en un mismo caso para coordinar esfuerzos.
  - C)** Es un tipo de terapia, desarrollada inicialmente en Bélgica, centrada en la incorporación laboral de pacientes psicóticos.
  - D)** Es un tipo de terapia encaminada a la socialización de pacientes inmigrantes.
- 160.-** ¿Cuál de los siguientes factores es más decisivo para el aprendizaje de una técnica de relajación?:
- A)** La intensidad y duración de las contracciones musculares
  - B)** El uso de una técnica que implique técnicas cognitivas
  - C)** Que se realice en un ambiente adecuado
  - D)** La práctica habitual, sobre todo al comienzo

