

# Vamos al colegio... ...pero ¡SIN ELLOS!

## Esquema de tratamiento ante los piojos



### SOSPECHA DE PEDICULOSIS

(Picor y rascado frecuente; presencia de piojos en personas del entorno)

**EXISTEN PIOJOS ADULTOS  
Y LIENDRES VIVOS**

**Observación y  
cepillado con lendreras**

**AUSENCIA DE PIOJOS  
ADULTOS VIVOS**

### TRATAMIENTO PEDICULICIDA

Recomendado: loción de permetrina 1,5% + cepillado con lendreras

### NO TRATAR

Observación y cepillado regular

Repetir tratamiento a los 7-10 días

### Observación y cepillado a la semana del 2º tratamiento

Ausencia de piojos

Presencia de piojos adultos vivos y larvas vivas

Presencia de piojos adultos vivos  
y ausencia de larvas

### TRATAMIENTO EFICAZ

¿Aplicación correcta?

↓	↓
SÍ	NO
↓	↓
Resistencia	Educación sanitaria

Reinfestación

Control contactos

### TRATAMIENTO ALTERNATIVO (Consulta pediátrica)



**EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES  
DE 2 AÑOS NO SE RECOMIENDA  
EL USO DE NINGÚN PRODUCTO  
PEDICULICIDA.**



En caso de intoxicación  
contacte con el  
INSTITUTO NACIONAL  
DE TOXICOLOGÍA  
91-562-04-20