



## SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

\_\_\_\_\_

APELLIDOS, NOMBRE

\_\_\_\_\_

D.N.I.

### PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA DE LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 16 de marzo de 2010 (B.O.C. de 19 de marzo)

Categoría: **F.E.A. PSIQUIATRÍA**

#### ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **3 horas**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta .
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- ¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario común del valproato?
  - A) trombocitopenia
  - B) aumento de peso
  - C) temblor
  - D) caída del cabello
- 2.- Paciente bipolar en tratamiento con litio, la familia refiere escasa mejoría persistiendo la aceleración del paciente, el insomnio y las alteraciones de conducta. ¿cuál de las siguientes características es un predictor de mala respuesta a dicho tratamiento?
  - A) Presencia de síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo.
  - B) Inicio temprano del trastorno bipolar.
  - C) Evolución con 1-2 episodios al año.
  - D) Suspensión del tratamiento en las fases de estabilización.
- 3.- Todas las enfermedades que se describen a continuación tienen una clara relación con factores psicológicos menos:
  - A) Asma bronquial.
  - B) Psoriasis.
  - C) Osteoporosis.
  - D) Enfermedad inflamatoria intestinal.
- 4.- ¿Cuál de las siguientes sustancias actúa como ansiolítico?
  - A) Clonidina.
  - B) m-Clorofenilpiperacina (mCPP).
  - C) Isoproterenol.
  - D) Yohimbina.
- 5.- Mujer de 82 años, sin antecedentes destacables y que vive sola. Refiere en las últimas 10 semanas un cuadro de anorexia, anhedonia e insomnio. Está más irritable, olvidadiza y con pérdida de peso de 5 kg. Ha restringido de forma notable su vida de relación social. La exploración física y las pruebas complementarias son normales. El Mini-Mental es de 25 y la Geriatric Depression Scale de 12 sobre 15. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
  - A) Cuadro Confusional Agudo
  - B) Demencia tipo Alzheimer
  - C) Demencia Vascular
  - D) Depresión
- 6.- ¿Cuál de los siguientes es el efecto secundario menos frecuentemente asociado con los ISRS?
  - A) insomnio
  - B) boca seca
  - C) sudoración excesiva
  - D) náuseas
- 7.- ¿Cuál de los siguientes es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina?
  - A) duloxetina
  - B) paroxetina
  - C) citalopram
  - D) fluoxetina
- 8.- En el trastorno esquizoide de personalidad, es característico:
  - A) Fracasar a pesar de sus esfuerzos, en los intentos de establecer relaciones interpersonales
  - B) Indiferencia a la crítica
  - C) Teatralidad.
  - D) Cuestionar sin justificación la fidelidad de la esposa o pareja sexual
- 9.- De acuerdo con el DSM-IV, para diagnosticar un trastorno depresivo mayor como recurrente ¿cuánto tiempo debe transcurrir como mínimo?
  - A) Un periodo de 3 meses
  - B) Un periodo de 2 meses
  - C) Un periodo de 1 mes.
  - D) Un periodo de 4 meses.

- 10.- No es función del Hospital de Día:
- A) Rehabilitación de las habilidades sociales
  - B) Acoger al paciente en períodos críticos de la enfermedad
  - C) Trabajo en técnicas corporales
  - D) Fomento de actividades ocupacionales
- 11.- Sobre el tratamiento del trastorno por angustia, ¿cuál es la afirmación correcta?
- A) En el tratamiento farmacológico son útiles los beta-bloqueantes.
  - B) Estos pacientes responden más rápidamente y a dosis menores de antidepresivos tricíclicos que los pacientes depresivos.
  - C) Se desarrolla con rapidez tolerancia a los efectos antipánico de los pacientes tratados con benzodiacepinas.
  - D) La exposición en vivo es el principal tratamiento conductual de las crisis de angustia.
- 12.- La alucinosis alcohólica:
- A) Es un caso de delirium.
  - B) Solo se da en los esquizofrénicos bebedores excesivos.
  - C) Es un caso de psicosis alucinatoria crónica.
  - D) Es un caso de delirium por abstinencia de sustancias.
- 13.- El tratamiento de elección en la fuga disociativa es:
- A) Cognitivo
  - B) Conductual
  - C) Psicodinámico
  - D) Sistémico
- 14.- El antidepresivo tricíclico más selectivo para la serotonina es:
- A) Amitriptilina.
  - B) Maprotilina.
  - C) Clomipramina.
  - D) Imipramina.
- 15.- En un caso de trastorno de Ideas Delirantes Persistentes, la aparición de alucinaciones
- A) Es lo habitual
  - B) Nos obliga a cambiar el diagnóstico
  - C) Según el DSM IV-TR pueden estar presentes alucinaciones olfativas acordes con el delirio
  - D) La CIE 10 permite la presencia de alucinaciones auditivas en tercera persona
- 16.- cual de los siguientes factores puede afectar una entrevista psiquiátrica:
- A) transferencia
  - B) contratransferencia
  - C) resistencias
  - D) todas las anteriores
- 17.- Señalar cuál de los siguientes síntomas NO es característico del trastorno obsesivo-compulsivo:
- A) Pensamientos e imágenes recurrentes.
  - B) Meticulosidad.
  - C) Ausencia de introspección.
  - D) Lentitud.
- 18.- Todos son trastornos del control de los impulsos menos:
- A) Cleptomanía.
  - B) Piromanía.
  - C) Erotomanía.
  - D) Ludopatía
- 19.- Respecto al trastorno ciclotímico ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- A) Es clínicamente una forma leve de trastorno bipolar
  - B) Presenta una prevalencia del 1 %.
  - C) Comienza con frecuencia antes de los 25 años
  - D) Todas las anteriores son ciertas

- 20.- Uno de los siguientes datos es el que MENOS sugiere un fondo orgánico en la enfermedad mental
- A) Inicio después de los 65 años de edad.
  - B) Consumo de tóxicos o tratamientos farmacológicos.
  - C) Síndrome psicopatológico atípico, mixto o incompleto
  - D) Abundancia en la historia clínica de pruebas diagnósticas complementarias sin hallazgos relevantes
- 21.- Para diagnosticar Trastorno Amnésico:
- A) El deterioro de la memoria debe durar varios años.
  - B) El paciente debe sufrir demencia al mismo tiempo.
  - C) No es típico del consumo de sustancias.
  - D) Todas las afirmaciones anteriores son falsas.
- 22.- En los niños las manifestaciones clínicas de los Trastornos Adaptativos puede presentarse con los fenómenos regresivos tales como:
- A) Volver a tener enuresis nocturnas,
  - B) Utilizar un lenguaje infantil o chuparse el dedo.
  - C) Disminución de rendimiento en el trabajo o en la escuela.
  - D) Todos estos son criterios para el diagnóstico de trastorno adaptativo en la infancia.
- 23.- Uno de los siguientes no tiene valor predictivo del curso de la esquizofrenia:
- A) Forma de inicio
  - B) Consumo de sustancias
  - C) Relaciones sociales
  - D) Síntomas de primer rango
- 24.- Con respecto a la evaluación en Rehabilitación Psicosocial es cierto que:
- A) Es necesario evaluar las habilidades
  - B) Es necesario evaluar el ambiente en el que va a interactuar el sujeto
  - C) Debe tener un carácter provisional
  - D) Todas las anteriores son ciertas
- 25.- En relación al suicidio en la esquizofrenia, señale cuál de los siguientes no se considera un factor de riesgo:
- A) Tentativas suicidas previas.
  - B) Desesperanza
  - C) Episodios depresivos.
  - D) Edad avanzada.
- 26.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre las crisis de angustia es falsa:
- A) Las palpitaciones son un síntoma relativamente raro dentro del cuadro.
  - B) La sensación de ahogo es un síntoma relativamente frecuente dentro del cuadro.
  - C) La crisis de angustia tiende a considerarse esencialmente endógena y diferente a la angustia permanente.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 27.- la frecuencia de aparición de episodios depresivos mayores es:
- A) Igual en hombres que en mujeres
  - B) el doble en mujeres que en hombres
  - C) el triple en hombres que en mujeres
  - D) el triple en hombres que en mujeres
- 28.- ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
- A) Irritabilidad, furia y nerviosismo son prominentes en el afecto depresivo de pacientes hispánicos
  - B) Mexicanos inmigrantes en EE.UU. presentan mayores niveles de ansiedad que mexicanos ya nacidos en EE.UU.
  - C) La prevalencia de alcoholismo en miembros de tribus indígenas norteamericanas es del 23%
  - D) En la India hay mayor prevalencia de formas catatónicas de esquizofrenia

- 29.- La triada de miosis, depresión respiratoria y coma es típica de intoxicación por:
- A) cocaína
  - B) opiáceos
  - C) anfetaminas
  - D) alucinógenos
- 30.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al trastorno de somatización es falsa?
- A) Es más frecuente en áreas rurales y entre personas con un bajo nivel educativo
  - B) Pocos pacientes experimentan mejorías significativas
  - C) Los factores hereditarios pueden ser importantes en su etiología
  - D) Los familiares varones de primer grado de los pacientes con este trastorno tienen tasas elevadas de trastornos psicóticos
- 31.- ¿Cuál de los siguientes anticonvulsivantes se emplea en la ansiedad?
- A) gabapentina
  - B) carbamazepina
  - C) ácido valproico
  - D) lamotrigina
- 32.- ¿Cuáles de los siguientes es síntoma de hiperprolactinemia secundaria a risperidona?
- A) osteoporosis
  - B) galactorrea
  - C) trastornos menstruales
  - D) todos los anteriores
- 33.- En el nivel asistencial de Atención Primaria se producen una serie de características respecto a la demanda de atención en salud mental de la población asignada, ¿Cuál de las siguientes no lo es?
- A) Las demandas asistenciales se presentan de forma inespecífica y mal definidas.
  - B) Las demandas son una mezcla de problemas de referencia somática, emocional y conductual.
  - C) Una de las mayores dificultades es precisar cuando un problema pasa a ser un cuadro clínico.
  - D) Se produce una baja accesibilidad y continuidad de asistencia.
- 34.- ¿Con cuál de los siguientes antidepresivos no se produce clínica de retirada del fármaco?
- A) mirtazapina
  - B) fluoxetina
  - C) amitriptilina
  - D) los tres pueden producirla
- 35.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, en relación al tratamiento farmacológico del Trastorno Obsesivo Compulsivo:
- A) El tratamiento farmacológico tiende a ser indefinido, dado que las recaídas tras la supresión del tratamiento son muy elevadas.
  - B) El efecto terapéutico antiobsesivo de los antidepresivos empieza a instaurarse hacia las 5-6 semanas de tratamiento, y no se consolida totalmente hasta las 10 o 12 semanas.
  - C) Hasta la actualidad, todos los antidepresivos disponibles han mostrado tener eficacia antiobsesiva a dosis altas.
  - D) No todas las terapias antiobsesivas poseen eficacia antidepresiva.
- 36.- El objetivo en la atención a personas con Enfermedad Mental Grave y prolongada debe incluir un Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR). Con respecto a este no es cierto
- A) El PIR constituye el plan estratégico que dirigirá el proceso rehabilitador y ordenará todas las intervenciones
  - B) Debe basarse tanto en las capacidades de la persona como en sus dificultades
  - C) Debe contener al menos los objetivos, su secuenciación, las estrategias terapéuticas y el modelo de evaluación
  - D) En la coordinación del PIR basta con una coordinación periódica semestral entre los distintos dispositivos de la red

- 37.- Señale cuál de los siguientes fármacos no ha mostrado efectividad en el tratamiento de la manía:
- A) Litio
  - B) Acido Valproico.
  - C) Lamotrigina
  - D) Todos los anteriores han mostrado efectividad.
- 38.- ¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario frecuente del litio?
- A) nauseas/vómitos
  - B) temblor
  - C) aumento de peso
  - D) estreñimiento
- 39.- ¿Qué porcentaje de niños con trastorno del aprendizaje tienen un trastorno psiquiátrico comórbido
- A) 10 %
  - B) 25%
  - C) 80%
  - D) 50%
- 40.- La eliminación de todas las siguiente benzodiacepinas está influida por enfermedad hepática o edad avanzada salvo:
- A) diazepam
  - B) alprazolam
  - C) midazolam
  - D) lorazepam
- 41.- En el T.O.C. no es cierto:
- A) El desarrollo de nuevas terapias conductuales y farmacológicas han mejorado el pronóstico
  - B) Los pacientes mantienen un nivel social adecuado
  - C) La depresión y la ansiedad son complicaciones frecuentes
  - D) La ausencia de compulsiones es un predictor de buen pronóstico
- 42.- ¿Cuál de los siguientes tipos de trastorno de la personalidad no corresponde al llamado de los sujetos temerosos o "cluster C"?
- A) TP por evitación.
  - B) TP Por dependencia.
  - C) TP esquizoide.
  - D) TP obsesivo-compulsivo.
- 43.- La Enfermedad por Cuerpos de Lewy es:
- A) Demencia clínicamente similar al Parkinson
  - B) Asociada a alucinaciones
  - C) Asociada a signos extrapiramidales
  - D) Todas las anteriores
- 44.- El Trastorno ciclotímico:
- A) Es lo mismo que el TBI.
  - B) Es lo mismo que la distimia.
  - C) Es incompatible con el TBI.Todas las afirmaciones con falsas.
  - D) Todas las afirmaciones con falsas.
- 45.- La Depresión postparto no se caracteriza por
- A) Afecta entre el 13-15% de las mujeres embarazadas
  - B) En algunos estudios la Venlafaxina consigue una remisión desde hasta el 80%
  - C) Si Existe antecedentes de depresión postparto debe iniciarse tratamiento profiláctico tras el parto
  - D) Nunca está indicado el ingreso por los efectos de la separación sobre el recién nacido y la madre

- 46.- ¿En cuál de los siguientes casos la terapia electroconvulsivante es un tratamiento de primera elección?:
- A) Esquizofrenia paranoide.
  - B) Psicosis reactiva.
  - C) Depresión mayor con síntomas melancólicos.
  - D) Trastorno equizotípico de la personalidad.
- 47.- En el modelo de filtros y niveles de Goldberg y Huxley en la asistencia psiquiátrica el nivel I corresponde con:
- A) comunidad
  - B) atención primaria
  - C) unidad de salud mental
  - D) hospital psiquiátrico
- 48.- En las personas que abusan de los anabolizantes esteroideos podemos encontrar:
- A) Inicialmente euforia e hiperactividad.
  - B) Tras un corto periodo de tiempo un aumento de la alerta, la irascibilidad, la ansiedad y la depresión.
  - C) Entre un 2 y 15% sufren una hipomanía o manía.
  - D) Todo lo anterior.
- 49.- La siguientes afirmaciones sobre la cocaína son ciertas, excepto:
- A) Sus efectos duran relativamente poco (30-60 minutos).
  - B) Sus metabolitos pueden estar presentes en sangre y orina más de 10 días.
  - C) Los infartos cerebrales no hemorrágicos son el efecto vascular cerebral asociado con más frecuencia.
  - D) La forma inhalada es la más peligrosa.
- 50.- En relación al Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) ¿Qué afirmación de las siguientes es falsa?
- A) La mayoría de la población ha estado expuesta a hechos traumáticos.
  - B) La prevalencia en población general del TEP es muy baja.
  - C) La mayoría de los casos se resuelven espontáneamente.
  - D) Todas son falsas.
- 51.- El tratamiento inicial de un paciente ciclador rápido debe ser con:
- A) Lamotrigina
  - B) Litio
  - C) Litio mas otro estabilizante
  - D) Topiramato
- 52.- Paciente varón de 22 años sin antecedentes personales relevantes ni consumo de tóxicos, llega a urgencias de psiquiatría presentando la siguiente sintomatología: se muestra desconfiado y suspicaz con el personal médico, refiere la ideación delirante de prejuicio y alucinaciones auditivas insultantes. Delante de su orientación diagnóstica, ¿cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado?
- A) Haloperidol.
  - B) Olanzapina.
  - C) Clozapina.
  - D) Risperidona.
- 53.- Una mujer refiere que escucha el color rojo cuando lo ve. ¿Cómo se llama este fenómeno?
- A) sinestesia
  - B) alucinación hipnagógica
  - C) ilusión
  - D) alucinación visual

- 54.- Toda sustancia que se emplea en el organismo humano con el objetivo de actuar sobre el sistema nervioso central para conseguir un incremento del rendimiento intelectual ó físico, experimentar nuevas sensaciones con fines lúdicos o para modificar el estado físico de quien la consume recibe el nombre de:
- A) Medicamento.
  - B) Droga legal.
  - C) Droga ilegal.
  - D) Droga.
- 55.- La ciclotimia se caracteriza por:
- A) alteración del estado de ánimo crónico
  - B) numerosos periodos de síntomas hipomaniacos
  - C) numerosos periodos de síntomas depresivos
  - D) todas las anteriores
- 56.- Uno de los siguientes trastornos de ansiedad se considera categoría diagnóstica oficial en la CIE-10 pero no la DSM-IV-TR, ¿Podría señalarlo?
- A) Agorafobia
  - B) Fobia específica
  - C) Trastorno obsesivo-compulsivo
  - D) Trastorno mixto ansioso-depresivo
- 57.- Un episodio maníaco debe tener una duración mínima para ser diagnosticado como tal de al menos (DSM-IV):
- A) 2 semanas.
  - B) 1 semana.
  - C) 3 semanas.
  - D) No se exige duración mínima para el diagnóstico.
- 58.- ¿Cuál de los siguientes psicofármacos deberá utilizarse de forma continuada en los pacientes con t. Bipolar?
- A) neurolépticos atípicos
  - B) estabilizadores del ánimo
  - C) antidepresivos
  - D) hipnosedantes
- 59.- Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación a los efectos adversos de las sales de litio en el tratamiento del trastorno bipolar:
- A) El litio puede ocasionar alteraciones de la función renal.
  - B) El litio puede causar alteraciones de la electrofisiología cardíaca.
  - C) El litio puede provocar exacerbación de la psoriasis.
  - D) El litio puede provocar insuficiencia respiratoria.
- 60.- Paciente de 30 años, sexo femenino, quien consulta por cuadro de 1 semana de evolución de disminución de la necesidad de dormir, dromomanía, ideas delirantes de grandeza, hiperactividad, alucinaciones auditivas " el señor me habla...yo tengo una misión especial en el mundo, yo debo salvar el mundo..." afecto irritable, heteroagresividad con su familia, dificultad para aceptar límites, conductas hipersexuales, gasto irresponsable del dinero. El diagnóstico más probable es:
- A) Trastorno esquizo afectivo
  - B) Episodio Maníaco
  - C) Trastorno Afectivo Bipolar I con síntomas psicóticos
  - D) Trastorno Hipomaniaco de la personalidad
- 61.- ¿Cual sería el elemento básico del modelo económico de la teoría de Freud?.
- A) El inconsciente
  - B) La libido
  - C) El conflicto
  - D) El complejo de Edipo



- 62.- La segunda causa aislada de Retraso Mental es:
- A) Fenilcetonuria
  - B) Hipotiroidismo
  - C) Síndrome de Down
  - D) Síndrome de Cromosoma X frágil
- 63.- Si queremos reducir el riesgo de desarrollar discinesia tardía, el tratamiento antipsicótico de preferencia es:
- A) Clozapina.
  - B) Risperidona.
  - C) Olanzapina.
  - D) Haloperidol.
- 64.- Los datos obtenidos en estudios de cohortes clínicas con historiales indican con claridad que las enfermedades médicas se asocian con aumento de la probabilidad de suicidio. Sin embargo existen determinadas patologías para las que los estudios no han podido determinar un incremento del riesgo. De entre las siguientes patologías cual no presenta un incremento del riesgo autolítico
- A) Epilepsia
  - B) Tumores de cuello
  - C) Artritis reumatoide
  - D) VIH
- 65.- ¿Quién propuso la teoría del doble vínculo?.
- A) Gregory Bateson y Donald Jackson.
  - B) Ruth y Theodore Lidz.
  - C) Margaret Mahler.
  - D) Edith Jacobson.
- 66.- En relación al Trastorno Obsesivo-compulsivo (TOC) y a la personalidad obsesiva, indique cuál de las siguientes aseveraciones es falsa:
- A) Los pacientes con TOC presentan rasgos egodistónicos mientras que en la personalidad obsesiva los rasgos suelen ser egosintónicos.
  - B) En los pacientes con TOC existe una sensación de compulsión contra la que se lucha mientras que no está presente en la personalidad obsesiva.
  - C) Cuando los pacientes con personalidad obsesiva se descompensan lo hacen hacia un trastorno obsesivo-compulsivo.
  - D) Hasta en un 25 % de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo coexiste una personalidad obsesiva.
- 67.- ¿Cuál de estos antidepresivos estaría menos indicado en el T.O.C.?
- A) Mirtazapina
  - B) Sertralina
  - C) Clorimipramina
  - D) Fluvoxamina
- 68.- El llamado "entrenamiento autógeno" es un método terapéutico que se utiliza en el tratamiento de :
- A) La esquizofrenia paranoide
  - B) El trastorno afectivo bipolar tipo I.
  - C) La disquinesia tardía
  - D) Los trastornos de ansiedad
- 69.- Señale la respuesta incorrecta:
- A) En un 85% de casos de TEA no se identifica una causa.
  - B) El M-CHAT es una herramienta sensible y específica para detectar los TEA
  - C) El EEG debe ser realizado a todos los niños con autismo.
  - D) Las preocupaciones de los padres son una fuente valiosa de información para detectar casos de autismo

- 70.- Una de las siguientes afirmaciones es FALSA:
- A) Los síntomas característicos de la Abstinencia severa por alcohol son: Desorientación, confusión, alucinaciones visuales ó táctiles, hiperactividad psicomotora y autonómica
  - B) El uso del Biperideno (Akinetón) es efectivo en los síntomas de impregnación neuroléptica
  - C) El uso de la Hormona Tiroidea en psiquiatría está indicada para el tratamiento de las Depresiones Unipolares resistentes al tratamiento
  - D) La Quetiapina es una Benzodiazepina de 4ª generación
- 71.- ¿Cuál de las siguientes no es una parasomnia?
- A) terrores nocturnos
  - B) pesadillas
  - C) sonambulismo
  - D) hipersomnio
- 72.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trastorno de pánico es falsa?
- A) se asocia a una excesiva utilización de recursos médicos
  - B) se asocia a más bajas laborales
  - C) el dolor torácico es infrecuente entre los pacientes con pánico
  - D) se asocia a deterioro del funcionamiento psicosocial
- 73.- Paciente que tras fumar marihuana presenta sintomatología psicótica aguda inducida por el consumo. ¿Cuál será el tratamiento correcto?
- A) entorno de apoyo
  - B) administrar haloperidol antes de las 6 horas del último consumo
  - C) administrar clonidina
  - D) todas las anteriores
- 74.- El tratamiento farmacológico de elección del trastorno por déficit de atención es:
- A) Haloperidol
  - B) Cloimipramina
  - C) Metilfenidato
  - D) Clonidina
- 75.- En caso de Trastorno de Angustia con o sin agorafobia:
- A) Hay que evitar el uso prolongado de Benzodiazepinas.
  - B) Usar lo menos que pueda al alprazolam.
  - C) Basar el tratamiento en psicoterapia y relajación.
  - D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 76.- Se deben tomar monitorizar los niveles de litio plasmático tomando muestras de:
- A) Los niveles máximos 1 hora después de la última dosis
  - B) Los niveles máximos 8 horas después de la última dosis
  - C) Los niveles en estado de equilibrio estacionado a media mañana
  - D) Los niveles mínimos 12 horas después de la última dosis
- 77.- Alonso es un paciente diagnosticado de esquizofrenia, que tiene antecedentes de varias tentativas suicidas. y episodios depresivos. Actualmente presenta un nuevo episodio depresivo, prolongado, habiendo presentado sólo una mejoría parcial a pesar de un tratamiento antipsicótico a dosis adecuadas, y diversas estrategias psicosociales empleadas. Asimismo, y también de forma prolongada, presenta ideación suicida, y Ud. considera que existe riesgo suicida. En cuanto al tratamiento antipsicótico, debería:
- A) Aumentar la dosis.
  - B) Reducir la dosis.
  - C) Cambiar a Clozapina.
  - D) Mantenerlo igual. El tratamiento antipsicótico no tiene influencia en la ideación suicida ni en la sintomatología depresiva.

- 78.- ¿Cuál de las siguientes preguntas de entrevista facilitaría mejor la comunicación con un paciente enfadado?
- A) ¿Es usted una persona que siempre está enfadada?
  - B) ¿Ha estado enfadado desde que era niño?
  - C) ¿Podría hablarme de su enfado?
  - D) ¿Por qué está enfadado?
- 79.- De los siguientes efectos secundarios de los neurolépticos, ¿cuál considera el más grave?
- A) distonia aguda
  - B) agranulocitosis
  - C) acatisia
  - D) taquicinesia
- 80.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la clínica de retirada de los antidepresivos?
- A) sólo ocurre con los tricíclicos
  - B) sólo ocurre con los IMAOS
  - C) sólo ocurre con los ISRS
  - D) ocurre con todas las clases de antidepresivos
- 81.- En el tratamiento agudo de la conducta violenta, ¿Cuáles de los siguientes pacientes acostumbran a responder a la intervención verbal o psicoterapia?
- A) Los pacientes con trastornos mentales orgánicos.
  - B) Los pacientes con trastornos sicóticos.
  - C) Los pacientes con trastornos no orgánicos ni sicóticos.
  - D) Ninguno de los anteriores.
- 82.- Las demencias subcorticales se caracterizan por todo menos
- A) Memoria y funciones cognocitivas menos afectadas al inicio
  - B) Alteraciones motoras y de la marcha
  - C) Síntomas afectivos no predominantes
  - D) Lenguaje preservado hasta estadíos evolucionados
- 83.- ¿Cuál de los siguientes trastornos de la personalidad tiene más riesgos de intento de suicidio?
- A) Trastorno narcisista de la personalidad.
  - B) Trastorno esquizoide de la personalidad.
  - C) Trastorno histriónico de la personalidad.
  - D) Trastorno límite de la personalidad.
- 84.- ¿En que rango de edad se diagnostica con más frecuencia el trastorno adaptativo?
- A) En la primera infancia
  - B) En la adolescencia
  - C) En la tercera edad dada la proximidad al desenlace final
  - D) En la madurez por coincidir esta con el abandono del hogar por parte de los hijos
- 85.- El efecto terapéutico de los antipsicóticos convencionales se debe a un bloqueo de los receptores:
- A) D2 en la vía nigroestriatal
  - B) Muscarinicos
  - C) D2 en la vía mesolímbica
  - D) Alfa 1
- 86.- En cuanto al uso de la Pregabalina en el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada sólo es cierto que:
- A) La dosis diana suele ser de 300 mg/día.
  - B) Está contraindicada en los pacientes ancianos.
  - C) Los efectos adversos más frecuentes son la disfunción sexual y el desarrollo de tolerancia farmacológica.
  - D) Actúa modulando el canal del calcio en la subunidad  $\beta$  del complejo del receptor de GABA.

- 87.- Niña de 10 meses que previamente no había presentado ningún retraso, encontrándose bien hasta el momento comienza a presentar pérdida de las habilidades manuales que ya tenía, deja de interesarse por juguetes, probablemente se trate de
- Síndrome de Asperger
  - Síndrome de Rett
  - Autismo típico
  - Trastorno desintegrativo
- 88.- la duloxetina es un antidepresivo que:
- inhibe de forma selectiva la recaptación de serotonina y noradrenalina
  - inhibe la recaptación de la dopamina
  - actúa sobre la MAO-B, estimulándola
  - es un ISRS
- 89.- El trastorno explosivo intermitente se caracteriza por:
- El trastorno explosivo intermitente se caracteriza por:
  - El grado de agresividad es desproporcionado a la intensidad del estresor.
  - Los episodios no se explican mejor por la presencia de otro trastorno.
  - Todas son verdaderas.
- 90.- El fármaco más eficaz en la eyaculación precoz es:
- Clomipramina.
  - Imipramina.
  - Fluoxetina.
  - Paroxetina.
- 91.- En el modelo, de filtros y niveles de Goldberg y Huxley en la asistencia psiquiátrica, el nivel I corresponde con:
- comunidad
  - atención primaria
  - unidad de salud mental
  - hospital psiquiátrico
- 92.- Los Centros Especiales de Empleo (CEE) no contemplan:
- Las empresas sociales no deben ofrecer un producto competitivo en el mercado
  - Prestar servicios de ajuste personal a los trabajadores discapacitados
  - Facilitar la integración de trabajadores discapacitados al mercado ordinario de trabajo
  - Asegurar un empleo remunerado a los trabajadores discapacitados
- 93.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome de Clerambault es falsa?
- Es frecuente en mujeres.
  - Las mujeres casadas presentan un riesgo mayor.
  - Puede aparecer en trastorno delirante, esquizofrenia, trastorno del estado de ánimo y otras enfermedades orgánicas.
  - Los sujetos afectados exhiben una conducta paradójica, interpretando todas las negativas, como afirmaciones ocultas de su delirio.
- 94.- El Sonambulismo es una Parasomnia que se caracteriza por:
- Episodios de actividad motora compleja
  - Aparecen durante el sueño de ondas lentas
  - Es más frecuente en el último tercio de la noche
  - a y b son ciertos
- 95.- El trastorno distímico es:
- de comienzo brusco
  - equivalente a la depresión duele
  - se suele dar en niveles sociales altos
  - más frecuente en mujeres que en hombres

- 96.- ¿Cuál de los siguientes rasgos de personalidad es el que menos frecuentemente se asocia con el trastorno límite de la personalidad?
- A) Histriónicos
  - B) Evitativos
  - C) Esquizoides
  - D) Esquizotípicos
- 97.- El tratamiento de elección en la intoxicación grave por litio es:
- A) Hemodiálisis.
  - B) Corregir la deshidratación.
  - C) Lavado gástrico.
  - D) Diuresis forzada.
- 98.- ¿En qué consiste el mecanismo de defensa denominado proyección?
- A) El rechazo inconsciente de los pensamientos, deseos, sentimientos o rasgos inaceptables de uno mismo y su atribución a otras personas.
  - B) La expresión conductual de un deseo o impulso inconsciente con el fin de evitar el afecto que acompañaría su reconocimiento consciente.
  - C) La desconfianza constante hacia los demás al percibir siempre malas intenciones en el entorno.
  - D) La redirección inconsciente de los sentimientos hacia un objeto menos importante o más seguro que la persona o situación que originalmente los despertó.
- 99.- Uno de los siguientes síntomas no es habitual en la demencia por cuerpos de Lewy:
- A) conducta perseverativa y estereotipada
  - B) alucinaciones visuales
  - C) delirios estructurados
  - D) alteración de la función ejecutiva
- 100.- La experiencia de la despersonalización (como síntoma)...
- A) Es poco frecuente.
  - B) Aparece únicamente en el trastorno de despersonalización y en la esquizofrenia.
  - C) Es frecuente en los pacientes epilépticos y en los migrañosos.
  - D) Ocurre a menudo en lesiones craneales, más frecuentemente cuanto más dure el periodo de inconsciencia.
- 101.- Varón de 17 años que es traído a urgencias por sus padres, que lo han encontrado dormido en su habitación y no han podido despertarlo. En su mesilla de noche han encontrado un envase vacío de benzodiazepinas. ¿Cuál es la manera más adecuada de escribir el "motivo de consulta"?
- A) "Intento de suicidio".
  - B) "Gesto autolesivo".
  - C) "Intoxicación medicamentosa".
  - D) "Sobredosis de medicación".
- 102.- ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene utilidad en la desintoxicación de alcohol?
- A) Naltrexona
  - B) Benzodiazepinas
  - C) Tiamina
  - D) Tiapride
- 103.- ¿Cuál es el ISRS menos asociado a síndrome de retirada?
- A) paroxetina
  - B) fluoxetina
  - C) velanfaxina
  - D) citalopram

- 104.-** El delirio de Clerambault o erotomaníaco consiste en:
- A) El cónyuge es infiel
  - B) El paciente está infestado por insectos o gusanos
  - C) Una persona significativa para el paciente ha sido suplantada por un impostor idéntico
  - D) El paciente es amado en secreto por una persona de un nivel social superior
- 105.-** ¿Cuál de las siguientes etiologías destaca como posible en el Retraso Mental ?
- A) Alteraciones cromosómicas
  - B) Exposición prenatal al alcohol
  - C) Infecciones víricas durante el embarazo
  - D) Todas las anteriores
- 106.-** el tratamiento del trastorno bipolar mixto
- A) con frecuencia hay que combinar estabilizadores
  - B) los antipsicóticos atípicos pueden mejorar el curso de la enfermedad
  - C) la psicoeducación es muy útil en estos pacientes
  - D) todas las anteriores son ciertas
- 107.-** Es más típico de la reacción paranoide que del brote esquizofrénico paranoide.
- A) Rasgos esquizoides.
  - B) Síntomas disociativos.
  - C) Organización sistemática del delirio.
  - D) Delirio sin construcción lógica.
- 108.-** En el tratamiento de las fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, señale la afirmación falsa respecto a la memantina:
- A) Es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato).
  - B) La dosis de mantenimiento es de 20 mg/d en dos tomas.
  - C) Está contraindicado su uso concomitante con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa.
  - D) Es un fármaco en general bien tolerado.
- 109.-** Respecto al Síndrome de Abstinencia alcohólica, las siguientes afirmaciones son falsas EXCEPTO:
- A) Las Benzodiazepinas están indicadas
  - B) Siempre debe tratarse comorbilidad psiquiátrica en eje II
  - C) Debe realizarse intervención cognitivo conductual
  - D) La Clonidina se debe usar para el manejo de la diaforesis
- 110.-** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trastorno disociativo es correcta?
- A) El curso clínico suele ser fluctuante, por lo general crónico y Recidivante
  - B) Las mujeres tienden a presentar mayor número de identidades que los varones
  - C) Los síntomas suelen ser menos manifiestos cuando los individuos tienen más de 40 años
  - D) Todas son correctas
- 111.-** En el Modelo matricial diseñado por Thornicroft y Tansela en 1998, para facilitar la evaluación de los sistemas de atención de salud mental, en el que combinan el modelo de producción de Donabedian en el eje de abscisas y los niveles geográficos (macro, meso y micro), ¿qué indicadores están en la fase c, de resultados ó fase de output?.
- A) Legislación en SM., Organización de la red de SM y Demanda de pacientes.
  - B) Indicadores nacionales de actividad, Patrones de uso y Calidad de la asistencia.
  - C) Tasa de suicidio, accesibilidad y calidad de vida.
  - D) Entradas, actividades y resultados.

- 112.- En relación a las alteraciones neurocognitivas, señale la respuesta falsa:
- A) No se han hallado asociaciones significativas entre alteraciones neurocognitivas y resultados funcionales, sino con tests específicos para su detección.
  - B) Entre las causas de la afectación neurocognitiva en la esquizofrenia se encuentra la reducción del volumen de la sustancia gris en la corteza prefrontal.
  - C) La evaluación neurocognitiva puede usarse para asignar pacientes a entrenamientos separados o métodos distintos.
  - D) El uso simultáneo de medidas subjetivas y objetivas de disfunción cognitiva puede proporcionar un marco más completo para los objetivos de rehabilitación en pacientes con esquizofrenia.
- 113.- En la prevención del síndrome de abstinencia alcohólica se recomienda:
- A) El uso de pautas descendentes de benzodiazepinas o clormetiazol
  - B) El uso de una benzodiazepina de semivida corta
  - C) En hepatopatía grave el uso de clormetiazol
  - D) La hospitalización del paciente
- 114.- En el síndrome neuroléptico maligno no es frecuente observar:
- A) Rigidez
  - B) Bradicardia
  - C) Diaforesis
  - D) Incontinencia
- 115.- Según el DSM-IV-TR el diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo no debe considerarse si el paciente ha padecido en algún momento la presencia de 4 trastornos. Señale, de entre los siguientes el que no pertenece a esos 4 diagnósticos señalados:
- A) Trastorno de ansiedad generalizada
  - B) Trastorno obsesivo-compulsivo
  - C) Trastorno distímico
  - D) Trastorno depresivo mayor
- 116.- ¿En que rango de edad se diagnostica con más frecuencia el trastorno adaptativo?
- A) En la primera infancia.
  - B) En la adolescencia.
  - C) En la tercera edad dada la proximidad al desenlace final.
  - D) En la madurez por coincidir esta con el abandono del hogar por parte de los hijos.
- 117.- El Derecho a la información de los pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud:
- A) reconoce también el respeto a la voluntad de no ser informado
  - B) la información se ha de dar siempre, aunque no quiera el interesado
  - C) la norma no resuelve esta polémica de la doctrina
  - D) no existe el derecho a la información del paciente
- 118.- De entre los siguientes antidepresivos, señale cuál de ellos tiene un mayor potencial de interacciones con otros fármacos:
- A) Venlafaxina
  - B) Paroxetina
  - C) Escitalopram
  - D) Sertralina
- 119.- Señale la afirmación falsa de entre las indicadas sobre los efectos adversos de los antipsicóticos de primera generación o convencionales:
- A) El aumento de peso es un efecto adverso potencial.
  - B) Pueden producir efectos cardiovasculares, como hipotensión ortostática, taquicardia y prolongación del intervalo QT.
  - C) Las convulsiones son uno de los efectos adversos potenciales.
  - D) El riesgo de convulsiones es mayor con los de alta potencia.

- 120.- ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente que motiva una atención psiquiátrica urgente en adolescentes?
- A) Conducta suicida.
  - B) Crisis de angustia.
  - C) Heteroagresividad.
  - D) Descompensación psicótica.
- 121.- ¿Sobre qué receptor se asocia principalmente el efecto de los antipsicóticos atípicos?
- A) Serotonina
  - B) histamina
  - C) dopamina
  - D) alfa adrenérgico
- 122.- La definición introducida en 1992 por la O.M.S: "Cuando existen problemas físicos o psicológicos como consecuencia del consumo de alcohol, independientemente de la cantidad consumida", corresponde a:
- A) Abuso de alcohol
  - B) Dependencia al alcohol
  - C) Consumo perjudicial de alcohol
  - D) Síndrome de abstinencia al alcohol
- 123.- Señale el factor predictivo mas valido para conseguir un resultado satisfactorio en la psicoterapia breve:
- A) Motivación del paciente.
  - B) Manejo de los conceptos psicológicos.
  - C) Concentración en resolver los conflictos.
  - D) Desarrollo de alianza terapéutica.
- 124.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede ser una característica de Juego Patológico?
- A) Es recurrente y persistente.
  - B) Se realiza para prevenir o reducir malestar.
  - C) Tiene características de tolerancia y abstinencia
  - D) Todas las anteriores.
- 125.- Imagínese un paciente alcohólico diagnosticado además un trastorno bipolar, al que se le ha puesto carbamacepina para prevenir las recaídas de su trastorno afectivo. Este paciente está tomando dosis de 800 mg/día y acude a urgencias, traído por la familia, debido a un episodio de confusión. Lleva 8 meses sin beber alcohol y las pruebas hepáticas son normales. ¿Qué sospecharía como posible causa de dicho cuadro clínico?
- A) Toxicidad neurológica típica de CBZ más el etanol.
  - B) Un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.
  - C) Se trataría de un episodio de delirium tremens con pruebas hepáticas normales.
  - D) Se trataría de una hipernatremia transitoria secundaria al fármaco.
- 126.- ¿Cuál de las siguientes es la característica fundamental del trastorno de ansiedad generalizada (TAG), según el DSM-IV-TR?
- A) Miedo/evitación acusados de situaciones sociales
  - B) Pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes que se experimentan como intrusos
  - C) Miedo/evitación de objetos o situaciones circunscritas
  - D) Ansiedad y preocupación excesiva difícil de controlar
- 127.- La prevalencia de la esquizofrenia es en la mayoría de estados epidemiológicos:
- A) entre 0,5 y 0,8 % de la población general
  - B) entre 1,5 y 2% de la población general
  - C) alrededor del 3% de la población
  - D) ninguna de las anteriores.
- 128.- Cuál de los siguientes trastornos no está incluido en los trastornos somatomorfos
- A) trastorno de somatización
  - B) hipocondría
  - C) neurastemia
  - D) trastorno dismorfico corporal



- 129.- ¿Cuál es la anomalía cerebral estructural más frecuentemente observada en pacientes con esquizofrenia?
- A) Ensanchamiento de los surcos.
  - B) Atrofia cerebelar.
  - C) Dilatación ventricular.
  - D) Atrofia frontal.
- 130.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se incluye en la definición de enfermo mental crónico?
- A) Estancia en Hospital psiquiátrico de más de 5 años de duración
  - B) Presencia de enfermedad psiquiátrica grave, fundamentalmente psicosis afectivas y esquizofrenis
  - C) Afectación de la competencia social
  - D) Larga duración
- 131.- Cuál de las afirmaciones con respecto al suicidio es incorrecta
- A) Existe mayor riesgo suicida en familiares de pacientes depresivos que en familiares de paciente con mania o esquizofrenia
  - B) Las tasas de suicidio son más altas en zonas urbanas
  - C) El riesgo de suicidio en la Esquizofrenia está en torno al 10%
  - D) El periodo de menor riesgo suicida en la esquizofrenia son los meses siguientes al alta hospitalaria
- 132.- En relación al Síndrome de Gilles de la Tourette, señale la afirmación falsa:
- A) En su etiología está implicado el sistema dopaminérgico
  - B) Cursa con tics motores múltiples, y aparición de al menos un tic vocal en algún momento del trastorno
  - C) Deben evitarse los antipsicóticos típicos ya que empeoran los tics
  - D) No existe ninguna prueba de laboratorio diagnóstica
- 133.- Sobre la prevención terciaria en psiquiatría , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- A) Se dirige exclusivamente a pacientes con diagnóstico de psicosis
  - B) Se desarrolla siempre en el ámbito comunitario
  - C) No puede aplicarse a programas orientados a pacientes con un solo episodio de la enfermedad
  - D) Ninguna es correcta
- 134.- Sería esperable que un antipsicótico atípico funcionara mejor que un antipsicótico típico para cuáles de los siguientes síntomas:
- A) Alucinaciones.
  - B) Delirios religiosos.
  - C) Bloqueos del pensamiento.
  - D) Disfunción cognitiva.
- 135.- ¿Cuál de los siguientes antidepresivos está contraindicado en el tratamiento de pacientes con bulimia?
- A) Bupropion
  - B) mirtazapina
  - C) velanfaxina
  - D) trazodona
- 136.- Con respecto a las Fobias
- A) La fobia social tiende a aparecer en edades tempranas
  - B) La Agorafobia es más frecuente en mujeres
  - C) La edad de inicio de la agorafobia es en la adolescencia
  - D) A y b son correctas
- 137.- ¿Cuál de los siguientes factores no está asociado con ansiedad orgánica?
- A) comienzo de los síntomas después de los 35
  - B) historia de ansiedad de separación en la infancia
  - C) mala respuesta a los medicamentos anti-pánico
  - D) falta de conductas de evitación

- 138.- ¿Cuál de las siguientes características no se asocia a un buen pronóstico en la hipocondriasis?
- A) Nivel socioeconómico elevado
  - B) Buena respuesta al tratamiento de la ansiedad o depresión
  - C) Inicio lento de los síntomas
  - D) Ausencia de trastorno de personalidad
- 139.- En el DSM III y DSM IV los términos Psicósomático y Psicofisiológico fueron sustituidos por Factores Psicológicos que afectan el estado Físico, ¿Cuál de ellos viene descrito dentro de la clasificación actual?
- A) Trastorno mental que afecta a una enfermedad médica.
  - B) Síntomas psicológicos que afectan a una enfermedad médica.
  - C) Rasgos de personalidad o estilo de afrontamiento que afectan a una enfermedad médica.
  - D) Todas están descritas.
- 140.- El principal objetivo de la entrevista es:
- A) Conocer al enfermo, su familia y su entorno
  - B) Ganarse la confianza del enfermo y su familia
  - C) Adscribir el enfermo a un diagnóstico
  - D) Todas las respuestas son acertadas
- 141.- En el Trastorno de Angustia con agorafobia:
- A) El síntoma fundamental es la crisis de angustia.
  - B) El síntoma fundamental es la ansiedad permanente.
  - C) El síntoma fundamental es la repercusión somática.
  - D) El síntoma fundamental es la taquicardia.
- 142.- En las primeras horas del síndrome de abstinencia a opiáceos se presenta:
- A) Insomnio
  - B) Craving
  - C) Midriasis
  - D) Lagrimeo
- 143.- ¿Con cuál de los siguientes fármacos NO se ha descrito una interacción con la Metadona?
- A) Acido Valproico
  - B) Rifampicina
  - C) Fluvoxamina
  - D) Disulfiram
- 144.- Señalar cuál de los siguientes síntomas no pertenece al trastorno límite de la personalidad:
- A) Ansiedad crónica.
  - B) Neurosis polisintomáticas.
  - C) Conducta adictiva y descontrol de impulsos.
  - D) Conducta escrupulosa e inflexible.
- 145.- En los trastornos esquizoafectivos tanto los síntomas afectivos como los esquizofrénicos :
- A) Se presentan simultáneamente.
  - B) Pueden ser de tipo maníaco.
  - C) Pueden ser de tipo depresivo.
  - D) Todos son verdaderos
- 146.- ¿Qué es cierto acerca de la psicosis puerperal?
- A) La mayoría de los estudios apunta a una relación con los trastornos del estado de ánimo.
  - B) Raramente ocurre tras el nacimiento del primer hijo.
  - C) Los siguientes embarazos no se asocian a un mayor riesgo de psicosis posparto.
  - D) La recurrencia de episodios patológicos sin relación con embarazos posteriores es excepcional.

- 147.- Enfermo de 81 años, con larga historia de psicosis bipolar, que venía siendo tratado con 30 mg/día de oxacepam. Ante la aparición gradual de síntomas depresivos, se le prescriben 20 mg/día de paroxetina. Una semana después de iniciar este tratamiento, se observa mejoría de algunos síntomas depresivos, pero el paciente se queja de una gran inquietud interna, que se agrava al tener que acostarse o sentarse quieto: va y viene de un lado a otro todo el día. ¿Cómo hay que interpretar los síntomas descritos y qué conducta hay que seguir?:
- A) Los síntomas son premonitorios de la inversión del ciclo y hay que agregar carbonato de litio.
  - B) Son síntomas propios de un cuadro ansioso que se asocia con frecuencia a los cuadros depresivos. Es mejor esperar y observar la evolución.
  - C) Es un cuadro de acatisia y debemos suprimir la paroxetina.
  - D) Pueden ser síntomas de un cuadro orgánico de origen vascular. Serían necesarias exploraciones neurológicas complementarias.
- 148.- Según la CIE-10, la nosofobia está incluida dentro de los trastornos:
- A) Del espectro del síndrome de Fregoli
  - B) Obsesivo compulsivos
  - C) Fóbicos
  - D) Hipocondríacos
- 149.- El Trastorno Bipolar:
- A) Cursa sin deterioro de las funciones cognitivas.
  - B) Es más deteriorante que la Esquizofrenia.
  - C) El paciente es tributario de la invalidez absoluta.
  - D) Todas las afirmaciones son falsas.
- 150.- En caso de Delirium Tremens alcohólico:
- A) Siempre hay que ingresar al paciente.
  - B) Debe ingresar en el Servicio de Medicina Interna.
  - C) Tener especial cuidado con la presencia de convulsiones.
  - D) Todas las respuestas son ciertas.

#### PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- ¿cual de las siguientes características es más frecuente en la depresión atípica?
- A) mejor respuesta a IMAO y escasa a los tricíclicos
  - B) insomnio
  - C) ganancia de peso
  - D) frecuente en hombres y raro en mujeres
- 152.- Un paciente que está siendo tratado con interferón para la hepatitis C refiere padecer depresión, ansiedad e irascibilidad . ¿Cuál de los siguientes agentes farmacológicos tiene mayor respaldo en cuanto a eficacia para el tratamiento de estos síntomas ?
- A) Trazodona
  - B) Haloperidol
  - C) Risperidona
  - D) Sertralina
- 153.- Entre las recomendaciones terapéuticas de la demencia vascular no está:
- A) Hipotensores.
  - B) Antitrombóticos.
  - C) Hipolipemiantes.
  - D) Antiinflamatorios no esteroideos.
- 154.- En el trastorno de ideas delirantes, la idea o ideas:.
- A) Deben estar presentes por lo menos 3 meses
  - B) No dependen de factores culturales
  - C) No hay evidencia de lesión cerebral.
  - D) Todas son correctas

- 155.-** En la pica infantil:
- A)** Los niños con pica no presentan déficits neurológicos
  - B)** Es recomendable medir el nivel de plomo en sangre
  - C)** En su desarrollo no es un factor contribuyente la imitación
  - D)** Es mucho más prevalente en niños que en niñas
- 156.-** Señale cuál de entre los siguientes antipsicóticos produce un menor antagonismo de los receptores D2:
- A)** Haloperidol
  - B)** Clozapina
  - C)** Risperidona
  - D)** Amisulprida
- 157.-** ¿Cuál de las siguientes patologías puede ser factor de riesgo para la aparición de un delirium?
- A)** ITU
  - B)** infección herida quirúrgica
  - C)** consumo habitual de alcohol
  - D)** todas las anteriores
- 158.-** Pertenecen a las Butirofenonas, EXCEPTO:
- A)** Levomepromazina
  - B)** Clozapina
  - C)** Haloperidol
  - D)** Trifluoperazina
- 159.-** La parada del pensamiento se utiliza en:
- A)** Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
  - B)** Trastorno por angustia.
  - C)** Trastorno por estrés agudo.
  - D)** Fobia.
- 160.-** ¿A que corresponde un cociente de inteligencia (CI) de 40?
- A)** Retraso Mental leve.
  - B)** Retraso Mental moderado.
  - C)** Retraso Mental grave.
  - D)** Retraso Mental profundo.

