



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA DE LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 16 de marzo de 2010 (B.O.C. de 19 de marzo)

Categoría: **F.E.A. ESTOMATOLOGÍA**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **3 horas**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- La clase II división I/II de Angle se distingue por la posición de:
 - A) Incisivos superiores.
 - B) Incisivos inferiores.
 - C) Caninos superiores.
 - D) Molares superiores.
- 2.- ¿Cuál de las siguientes patologías es una displasia genética del esmalte?
 - A) Dientes de Turner.
 - B) Amelogénesis imperfecta.
 - C) Dientes de Hutchinson.
 - D) Todas son ciertas.
- 3.- Los movimientos ortodóncicos coronorradiculares en el plano mesiodistal son;
 - A) Movimientos de 1º orden
 - B) Movimientos de 2º orden
 - C) Movimientos de 3º orden
 - D) Movimientos de 4º orden
- 4.- El tumor de Pindborg;
 - A) Se desarrolla a partir del cemento radicular.
 - B) Más frecuentes en maxilar.
 - C) Radiográficamente presenta transparencia irregular.
 - D) Es un tumor epitelial con ectomesénquima.
- 5.- En la fotopolimerización de resinas compuestas con luz halógena.
 - A) El iniciador es una canforoquinona.
 - B) Corresponde al espectro de luz verde.
 - C) La longitud de onda es de 720-760 nanómetros.
 - D) Todas son correctas.
- 6.- El síndrome de Sjögren;
 - A) Existe tumefacción parotídea en la mayoría de los casos.
 - B) La selección mujer. Hombre es 2:1.
 - C) En la forma 1ª no existe conectivopatía sistémica.
 - D) Todas son ciertas.
- 7.- ¿Cuál de estos síndromes no está relacionado con la hipodoncia?
 - A) Síndrome de Bööck
 - B) Síndrome de Robinson
 - C) Síndrome de Gardner
 - D) Síndrome de Struge-Weber
- 8.- El signo clínico patognomónico de la G.U.N.A. es:
 - A) Dolor gingival.
 - B) Hemorragia espontánea o con ligera provocación.
 - C) Halitosis.
 - D) Necrosis y ulceración de las papilas interproximales.
- 9.- La hipercementosis es un trastorno en el desarrollo del cemento
 - A) Genética.
 - B) Ambiental.
 - C) Suele localizarse en el tercio coronal.
 - D) B y C son ciertas.
- 10.- La incidencia de agencias por orden de frecuencia;
 - A) Segundo premolar inferior, incisivo lateral superior, segundo premolar superior.
 - B) Segundo premolar superior, segundo premolar inferior, incisivo lateral superior.
 - C) Segundo premolar inferior, segundo premolar superior, incisivo lateral superior.
 - D) Segundo premolar superior, incisivo lateral superior, segundo premolar inferior.

- 11.- En la extracción quirúrgica de cordales;
- A) La ostectomía se realiza con turbina y fresa de fisura.
 - B) La odontosección se realiza con micromotor y fresa redonda de tungsteno.
 - C) La odontosección se realiza con turbina y fresa de fisura.
 - D) B y C son ciertas.
- 12.- ¿Qué especie bacteriana encontraríamos en un diente con fracaso endodóntico?
- A) Enterococcus faecalis.
 - B) Actinomyces israelí.
 - C) Ambas.
 - D) Ninguna.
- 13.- El líquen plano oral presenta;
- A) Ausencia de displasia
 - B) Regeneración hidrópica de la capa basal.
 - C) Infiltrado en banda subepitelial de linfocitos T.
 - D) Todas ellas.
- 14.- La hora de visita del niño al consultorio dental:
- A) Es mejor citarlos al mediodía, tras la comida porque están más tranquilos.
 - B) Es preferible citar a los más pequeños a primera hora.
 - C) La edad no influye a la hora de elegir la cita del niño.
 - D) Ninguna respuesta es correcta.
- 15.- Entre los instrumentos que se utilizan en la técnica manual para la remoción de la placa bacteriana calcificada no se encuentra:
- A) Curetas Gracey
 - B) Cinceles
 - C) Lima periodontal
 - D) Periostotomos
- 16.- En la osteorradionecrosis, señale la falsa;
- A) La relación hombre- mujer es 3:1.
 - B) Relación mandíbula maxilar es 9:1.
 - C) Su incidencia es del 10%
 - D) Todas son falsas.
- 17.- ¿Cuál de los siguientes accidentes mecánicos no existirían en presencia de un canino incluido superior?
- A) Desplazamiento dientes vecinos.
 - B) Reabsorción coronaria canino incluido.
 - C) Todas son posibles.
 - D) Todas son falsas.
- 18.- La instrumentación rotatoria ultrasónica del conducto radicular produce;
- A) Microcorrientes acústicas
 - B) Cavitación
 - C) Implosión
 - D) Acción bactericida
- 19.- Con respecto a la histopatología del cáncer oral es falso que;
- A) Más del 90% corresponden a carcinomas epidermoides de la mucosa oral.
 - B) El limfoepitelioma es una variante infrecuente de carcinoma epidermoide.
 - C) El carcinoma verrucoso invade precozmente en profundidad.
 - D) El carcinoma fusocelular es una variante de pronóstico más benigno.
- 20.- Los selladores de fisuras, indique la falsa;
- A) Disminución en la prevalencia de caries en un 95% si no se caen.
 - B) Han de reponerse hasta en un 50% de los casos.
 - C) Está contraindicado en dentición con tendencia a caries.
 - D) La retención del sellador es mayor en bocas con mejor higiene

- 21.- No pertenece al grupo de la doble formación de diente;
- A) Concrecencia
 - B) Coalescencia
 - C) Geminación
 - D) Rizomegalia
- 22.- No es una variación de la forma de la corona;
- A) Diente evaginado
 - B) Germinación
 - C) Globodoncia
 - D) Diente invaginado
- 23.- Ante un diente permanente intruido;
- A) Puede permitirse una erupción espontánea si la intrusión es superior a 6 mm
 - B) La tracción ortodóntica debe iniciarse a las 3-4 semanas.
 - C) La extracción quirúrgica inmediata sólo si el ápice está abierto
 - D) Todas son falsas
- 24.- Es falso que en la anestesia troncular del nervio lingual;
- A) La localización de la inyección del anestésico es similar a la del nervio dentario inferior.
 - B) Usada en intervenciones del suelo de la boca.
 - C) Determina anestesia de la hemilengua homolateral.
 - D) Todas son ciertas.
- 25.- En la inclusión de incisivos;
- A) Normalmente situadas en palatino.
 - B) Suele ser bilateral.
 - C) La causa más común es la presencia de un supernumerario.
 - D) Son ciertas A y C.
- 26.- En la dentinogénesis imperfecta es falso;
- A) El mecanismo patogénico es el mismo que el de la osteogénesis imperfecta.
 - B) La dentina opalescente hereditaria se hereda de forma autosómica recesiva
 - C) La displasia dentinaria radicular tiene una herencia autosómica dominante.
 - D) La displasia dentinaria coronaria es poco frecuente.
- 27.- En referencia a la expansión palatina rápida quirúrgicamente asistida;
- A) La expansión transversal no debe comenzar hasta después de una semana de la intervención.
 - B) Cuanto mayor es el paciente, más sencilla es la técnica.
 - C) La ostectomía horizontal debe realizarse en escalón para obtener una expansión paralela al plano oclusal que prevenga discrepancias verticales.
 - D) No es recomendable activar el distractor ortodóntico durante la cirugía.
- 28.- Las siglas CPITN hacen referencia:
- A) Índice de hemorragia del surco.
 - B) Índice de Löe y Silnes.
 - C) Índice de necesidades de tratamiento periodontal comunitario.
 - D) Índice de Ramfjord.
- 29.-Cuál de entre las siguientes reveladores de placa es el más usado;
- A) Tartracina.
 - B) Violeta de genciana.
 - C) Eritrosina.
 - D) Rox de bengala.
- 30.- El quiste folicular;
- A) Debe de ser enucleado sin extracción del diente causal para permitir su erupción.
 - B) Es un hallazgo radiográfico causal.
 - C) También denominado perlas de Epstein.
 - D) No se trata para no afectar la erupción de dientes vecinos.

- 31.- Una infratrituración de la amalgama conlleva las siguientes situaciones, excepto una;
- A) Poca plasticidad.
 - B) Disminución de la resistencia mecánica.
 - C) Mayor contracción inmediata.
 - D) Aumento del creep
- 32.- En el tratamiento de las clases III la aparatología ortopédica-ortodóncica consta de todos los siguientes dispositivos excepto
- A) Mentonera.
 - B) Placa de progenie
 - C) Máscara facial.
 - D) Twin-block
- 33.- Como se denomina al conducto de la glándula sublingual?
- A) Stenon
 - B) Wharton
 - C) Rivinus
 - D) Bartholino
- 34.- Con respecto a los centros de mineralización de la placa;
- A) Aparecen a los 7 días de la placa reciente.
 - B) Se dividen en A, B y C.
 - C) Los centros A corresponden a hidroxapatita.
 - D) Los centros C se sitúan periféricamente a los centros B.
- 35.- El orden de frecuencia en las agenesias de dientes temporales;
- A) ILS-2ºPMS-2ºPMI-ILI
 - B) ILS-2ºPMI-2ºPMS-ILI
 - C) 2ºPMI-ILS-2ºPMS-ILI
 - D) 2ºPMI-2PMS-ILS-ILI
- 36.- En qué porcentaje las sinusitis crónicas son de origen dental?
- A) 40%
 - B) 50%
 - C) 60%
 - D) 70%
- 37.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la anatomía de la articulación temporomandibular es falsa?
- A) La cara articular del cóndilo mandibular en su totalidad se halla tapizado por fibrocartilago articular.
 - B) Sólo la cresta condílea y la vertiente anterior del cóndilo mandibular son articulares.
 - C) En condiciones normales el menisco articular se halla fijo a los tubérculos conadileos interno y externo, haciéndose solidario en el movimiento con el cóndilo mandibular.
 - D) La cápsula medial de la articulación temporomandibular se inserta en la fisura escamotimpánica, lugar por donde emerge el nervio cuerda del tímpano.
- 38.- Con respecto a la hiper cementosis, ¿cuál es la respuesta correcta?
- A) La función masticatoria no interviene en la aparición.
 - B) La forma localizada produce una raíz en palillo de tambor.
 - C) La forma hiperplásica e hipertrófica comparten etiología.
 - D) Suelen asociarse hiper cementosis y cementolitos.
- 39.- Un problema asociado con los extensores de Ni-Ti es;
- A) La tendencia a incurvarse bajo presión de compactación.
 - B) La tendencia a romperse durante la condensación
 - C) La producción de mayor fuerza de cuña, que desencadena la fractura de la raíz.
 - D) No penetran con la misma profundidad que los extensores de acero inoxidable, a pesar de ser sometidos a la misma fuerza

- 40.- En el diagnóstico de sífilis oral;
- A) La V.D.R.L. es positiva a los cinco días del contagio.
 - B) La V.D.R.L. es una prueba no treponémica.
 - C) La V.D.R.L. es efectiva en el diagnóstico pero no en el seguimiento del tratamiento.
 - D) La V.D.R.L. no es útil en screening.
- 41.- El factor de coagulación XI se denomina;
- A) Factor de Christmas
 - B) Factor de Stuart-Powe
 - C) Factor hemofílico C
 - D) Factor de Hageman
- 42.- El tratamiento de la sífilis oral 1ª y 2ª;
- A) Penicilina G Bezantina 1,2 millones de U.I intramuscular tres días.
 - B) Penicilina G Bezantina 2,4 millones de U.I en dosis única intramuscular.
 - C) Penicilina G Bezantina 2,4 millones de U.I cada siete días durante tres semanas.
 - D) El etambutol puede usarse en caso de alergia a penicilina G Bezantina.
- 43.- En la técnica de aplicación de sellado de fosas y fisuras;
- A) No hay diferencias entre usar aislamiento absoluto o relativo.
 - B) No es necesario el uso de adhesivo.
 - C) Puede aplicarse flúor en barniz en el diente grabado al finalizar
 - D) Todas son ciertas.
- 44.- Las curetas After Fiver y Mini Five;
- A) Son de mayor curvatura que las Grecey.
 - B) Se usa para limpieza de furcas.
 - C) Ambas son falsas.
 - D) Ambas son correctas.
- 45.- La eritroplasia;
- A) Puede asociarse a líquen plano oral.
 - B) La transformación maligna es baja.
 - C) La lengua es la localización más frecuente.
 - D) El tratamiento es local tópico con corticoides.
- 46.- La fontanela que se encuentra entre el occipital y el parietal se denomina:
- A) Bregma
 - B) Lambda
 - C) Ptérica
 - D) Astérica
- 47.- En el diagnóstico de caries;
- A) La exploración con sonda puede transferir microorganismos cariogénicos a zonas no infectadas.
 - B) La radiografía es el método más eficaz en la detección de caries interproximales
 - C) La radiografía es el método más precoz en la detección de caries interproximales.
 - D) A y B son ciertas.
- 48.- La mandíbula deriva:
- A) Del primer arco branquial.
 - B) Del 2º arco branquial.
 - C) Del 3º arco branquial.
 - D) Del 4º y 5º arco branquial.
- 49.- ¿Cuáles son las técnicas más importantes en el control de la conducta del niño en la consulta de Odontopediatría?:
- A) Técnicas de modificación de conducta.
 - B) Técnicas de comunicación.
 - C) Técnicas de enfoque físico.
 - D) Técnicas de distracción.

- 50.- En el diagnóstico de patología pulpar;
- A) La aplicación de frío -80°C es muy específica en todos los casos.
 - B) El láser doppler sólo mide la microcirculación.
 - C) Los pulpómetros no reproducen el síntoma principal.
 - D) B y C son ciertas.
- 51.- El síndrome de maloclusión de clase II no se caracteriza por:
- A) Es la maloclusión mas frecuente.
 - B) En la subdivisión I, encontramos un resalte excesivo.
 - C) En la subdivisión I típicamente el músculo mentoniano es hipotónico.
 - D) la subdivisión II se caracteriza por una profundidad anormal de mordida.
- 52.- De las siguientes causas, ¿cuál puede favorecer a una infección iatrogénica?
- A) Tracciones ortodóncicas excesivas.
 - B) Tallados muy agresivos.
 - C) La práctica de una anestesia.
 - D) Todas ellas son ciertas.
- 53.- En la sedación ligera qué fármacos utilizaría de primera elección:
- A) Ansiolíticos.
 - B) Hipnóticos.
 - C) Narcóticos
 - D) Oxido nitroso
- 54.- En enjuagues fluorados, indique la falsa;
- A) Se usa el flúorurofosfato acidulado y el fluoruro sódico neutro.
 - B) Reducen las caries en un 65%
 - C) La dosificación del fluoruro sódico es 0'2 % semanal.
 - D) La dosificación del fluoruro sódico es 0'05% diario.
- 55.- Las fracturas marginales en obturaciones por amalgama de plata se deben a, una es falsa;
- A) Expansión retardada.
 - B) Deformación por escurrimiento.
 - C) Incorrecto recortado de la obturación.
 - D) Todas son correctas.
- 56.- Dentro de las glándulas salivares;
- A) Las glándulas de Blandin o Nühn son laterales y posteriores.
 - B) Las glándulas de Weber están en la cara inferior de la lengua, cerca del ápex.
 - C) A y B son ciertas.
 - D) A y B son falsas.
- 57.- El síndrome de Frey;
- A) Es doloroso.
 - B) Aparece a los 6-12 meses tras intervención quirúrgica.
 - C) Aparece en un 5% parotidectomías.
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta
- 58.- ¿Cuál de las siguientes no es correcta? ;
- A) Las glándulas palatinas son de tipo seroso.
 - B) Las glándulas labiales y bucales son de tipo mixto.
 - C) Las glándulas linguales posteriores y laterales son de tipo mucoso.
 - D) Todas son correctas.
- 59.- La dosis tóxica probable de Flúor se ha establecido:
- A) 12 mg/Kg
 - B) 0-3 mg/Kg.
 - C) 10-15 mg/Kg.
 - D) 5 mg/Kg.

- 60.- Qué proporción de caninos incluidos se localizan en palatino.
- A) 83%
 - B) 87%
 - C) 93%
 - D) 97%
- 61.- Los quistes radicular y paradental;
- A) Comparten histología
 - B) En el radicular el diente es avital.
 - C) El paradental afecta a pulpa y periodondo.
 - D) A y B son ciertas.
- 62.- El tratamiento de elección de un osteoma es:
- A) Cirugía
 - B) Radioterapia
 - C) Quimioterapia
 - D) Antiinflamatorios
- 63.- Son ramas del nervio nasociliar, todas menos una;
- A) Ramas filiares largas.
 - B) Nervio infratroclear.
 - C) Nervio supratroclear.
 - D) Nervio etmoidal posterior.
- 64.- La extracción dentaria;
- A) Es el tratamiento de elección en periodontitis apical crónica
 - B) Es el tratamiento de elección en fractura horizontal del tercio apical.
 - C) Se realiza en dientes deciduos si afecta a la erupción del permanente.
 - D) A y C son ciertas.
- 65.- Sialoadenitis bacterianas son;
- A) Asintomáticas, unilateral y de comienzo súbito.
 - B) Dolorosas , bilaterales y de comienzo súbito
 - C) Dolorosas, unilaterales de comienzo lento.
 - D) Dolorosas, unilaterales de comienzo súbito.
- 66.- El creep es un aspecto relevante en la amalgama, marque la falsa;
- A) Juega un papel importante en la producción de fracturas marginales
 - B) Mayores valores de creep, mayores deformidades.
 - C) La especificación nº1 de la ADA exige creep inferiores 8%.
 - D) Produce desplazamiento de unas partículas sobre otras dentro de la amalgama
- 67.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con Bacteroides spp?
- A) Son frecuentes los aislados puros a partir de conductos radiculares infectados con patología perirradicular.
 - B) Estos microorganismos se han asociado con procesos perirradiculares acompañados de signos y síntomas.
 - C) Estos microorganismos aportan grupos hemo y vitamina K a otras bacterias que forman parte del ambiente polimicrobiano.
 - D) Son cocos anaerobios G+ anteriormente clasificados como Porphyromonas
- 68.- En la infección odontógena, el paso de la fase endostal a flemón dentario;
- A) La fistulización resuelve el cuadro.
 - B) El dolor sigue siendo localizado.
 - C) La tumefacción se debe en gran medida a contenido purulento.
 - D) Existe una ligera mejora de la sintomatología dolorosa.
- 69.- En pacientes en tratamiento con quimioterapia;
- A) Las cirugías periodontales están contraindicadas
 - B) Los raspados y alisados radiculares están contraindicados
 - C) Los raspados y alisados radiculares son posibles
 - D) A y B son ciertas

- 70.- ¿Cuál de las siguientes es un factor predisponente a la aparición de micosis oral;
- A) Uso indiscriminado de antibióticos o corticoides.
 - B) Tabaquismo.
 - C) Uso indiscriminado de antisépticos.
 - D) Todas ellas
- 71.- En las osteomielitis crónicas, indique la falsa;
- A) La presencia de fístula evita la aparición de dolor.
 - B) Debe de eliminarse el sequestro óseo y pautar antibióticos.
 - C) A veces son necesarias resecciones mandibulares amplias.
 - D) Todas son ciertas.
- 72.- Dentro de los anestésicos locales;
- A) Anestésicos tipo éster poseen mayor riesgo de alergia que los tipo amida.
 - B) La procaína es un anestésico tipo amida.
 - C) La mepivacaína presenta una iniciación más lenta que la lidocaína.
 - D) Todas son falsas.
- 73.- ¿Cuál de las siguientes anomalías no corresponde a la raíz?
- A) Sinostosis.
 - B) Dilaceración.
 - C) Perlas de esmalte.
 - D) Todas son anomalías radicales.
- 74.- El único antibiótico que ha demostrado disminuir el CAOD en humanos es:
- A) Vancomicina.
 - B) Penicilina.
 - C) Eritromicina.
 - D) Clindamicina.
- 75.- El papiloma humano es un tumor benigno;
- A) Es de origen conectivo.
 - B) De etiología desconocida.
 - C) La extirpación no es necesaria,
 - D) Todas son falsas.
- 76.- El cementoblastoma se encuentra;
- A) En región premolar y primer molar en 80%.
 - B) La cementosis termina por producir necrosis pulpar.
 - C) Se observa en adultos mayores de 50 años.
 - D) No se observa en dientes temporales
- 77.- El agrandamiento gingival por ciclosporina, marque la falsa;
- A) Se debe al bloqueo de canales de calcio de las células NK.
 - B) Es independiente de la dosis.
 - C) Produce acantosis del estroma.
 - D) Produce hipertrofia del estroma.
- 78.- En la exéresis de un mucocele en labio inferior, ¿qué tipo de anestesia utilizarías?
- A) Troncular nervio dentario inferior ipsilateral.
 - B) Troncular nervio mentoniano.
 - C) Infiltrativo peritumor
 - D) Cualquiera de ellos.
- 79.- Un sialolito es más común verlo;
- A) Mujeres.
 - B) Glándula submaxilar.
 - C) Glándula parótida.
 - D) A y B son ciertas.

- 80.- Un injerto singénico es:
- A) Es un injerto entre especies distintas.
 - B) Es un injerto entre individuos genéticamente distintos de la misma especie.
 - C) Es un injerto entre individuos genéticamente idénticos
 - D) Es un injerto transferido desde un sitio a otro del mismo animal.
- 81.- En una cavidad clase III de amalgama, el diseño, señala la incorrecta;
- A) De extensión preventiva, el margen cavo superficial fuera del contacto del diente adyacente.
 - B) De extensión por sustentación, las paredes deben de ser cóncavas.
 - C) De extensión por retención, rieleras en ángulos axiokingival y axioincisal
 - D) De extensión por protección de la pulpa, la pared axial debe ser convexa.
- 82.- Las inclusiones dentarias afectan por orden a;
- A) Tercer molar inferior- caninos inferiores- tercer molar superior.
 - B) Tercer molar inferior- caninos superiores- tercer molar superior.
 - C) Tercer molar superior- tercer molar inferior- caninos superiores.
 - D) Tercer molar inferior- caninos inferiores- caninos superiores.
- 83.- La pilocarpina;
- A) Seguro sin contraindicaciones
 - B) Readministren 5 mgr cada veinticuatro horas.
 - C) Es un agonista colinérgico.
 - D) Todas son falsas.
- 84.- Qué tipo de caracterización tiene lugar tras una fractura horizontal del 1/3 medio;
- A) Fusión calcificante.
 - B) Banda de tejido conjuntivo.
 - C) Huesos entre los fragmentos.
 - D) Todas ellas.
- 85.- ¿Cuál de los siguientes músculos no pertenece al sistema neuromuscular el nervio masticador?
- A) Músculo tensor del velo del paladar.
 - B) Vientre anterior del músculo digástrico.
 - C) Vientre posterior del músculo digástrico.
 - D) Músculo pterigoideo medial.
- 86.- En qué clase de Miller nos encontramos una recesión que puede llegar a la línea mucogingival con pérdida de tejido interproximal y/o malposición dentaria;
- A) I
 - B) II
 - C) III
 - D) IV
- 87.- Dentro de las fracturas mandibulares la prevalencia según localización es mayor en;
- A) Sinfisaria.
 - B) Cuerpo mandibular.
 - C) Ángulo mandibular.
 - D) Cóndilo
- 88.- Señale cuál de estos agentes no se ha usado como agente químico de control de placa bacteriana:
- A) Derivados del amonio cuaternario.
 - B) Sanguinaria.
 - C) Hipoclorito sódico al 10%.
 - D) Fluoruros.
- 89.- La gammagrafía es útil en;
- A) Tumor de Whartin
 - B) Sialoadenitis agudas
 - C) Sind Sjögren
 - D) En todas ellas.

- 90.- La gingivitis necrotizante aguda se caracteriza por relacionarse con;
- A) Prevotella intermedia.
 - B) Sangrado, halitosis, pero con asintomáticas.
 - C) Ausencia de dolor espontáneo.
 - D) Nunca afecta más allá del límite mucogingival.
- 91.- En el líquen plano oral;
- A) El tipo reticular es asintomático.
 - B) El tipo atrófico se produce en paladar.
 - C) La etiología es conocida
 - D) A y C son verdaderas.
- 92.- Qué germen encontraremos más frecuentemente en la placa dental cariogena:
- A) Actinomyces Actinomycetemcomitans
 - B) Actinomyces Naeslundii
 - C) Streptococcus mutans
 - D) Streptococcus oralis
- 93.- En referencia a los cordales retenidos;
- A) El incluido es submucoso.
 - B) El enclavado es infraóseo.
 - C) El incluido heterotópico ocupa una posición cercana a la habitual.
 - D) Todas son falsas.
- 94.- Con respecto al cuadro de necrosis avascular condílea, señale la afirmación incorrecta;
- A) Las enfermedades sistémicas, tales como la enfermedad de Gaucher, infecciones, el desplazamiento discal con disfunción severa de la articulación temporomandibular y los traumatismos son causa de necrosis avascular condílea.
 - B) Siempre que se piense en este cuadro clínico hay que hacer diagnóstico diferencial con los cuadros de osteoartritis.
 - C) Las imágenes de resonancia nuclear magnética son específicas de esta entidad
 - D) En el tratamiento de esta entidad se pueden utilizar tanto medidas conservadoras como medidas quirúrgicas de reconstrucción condilar.
- 95.- ¿Cuál de las siguientes bacterias presenta asociación débil con patología periodontal;
- A) A. actinomycetemcomitans.
 - B) Streptococcus intermedius.
 - C) Fusobacterium nucleatum.
 - D) Bacteroides forsythus.
- 96.- En la celulitis crónica leñosa, señale la falsa;
- A) Tumoración dura.
 - B) Adherida a plamos profundos.
 - C) La piel es violácea e indolora.
 - D) Su resolución no deja cicatrices iatrogénicas.
- 97.- El óxido nitroso debe emplearse;
- A) Sin superar el 50% concentración.
 - B) Posee un olor desagradable
 - C) Por encima del 70% produce hipoxia.
 - D) A y C son ciertas
- 98.- La tuberculosis oral puede presentarse como;
- A) Ulceración dolorosa.
 - B) Lesiones papulomatosas.
 - C) Osteomielitis.
 - D) Todas ellas.
- 99.- La rigidez de un alambre TMA de 0.017 x 0.025" es de;
- A) 2.8
 - B) 3.5
 - C) 7.1
 - D) 8.0

- 100.-** Entre las características de la clorhexidina no se encuentran:
- A) Es una biguanida
 - B) Es bacteriostática
 - C) Su pH óptimo de acción es entre 5,5 y 7
 - D) Puede producir alteraciones del gusto
- 101.-** En cuanto a las polisacáridos de la placa bacteriana;
- A) La sacarosa, glucosa y fructosa son sus substratos.
 - B) Mecanismo para almacenar energía.
 - C) Muy importante en los procesos de adherencia.
 - D) Todas son ciertas.
- 102.-** La micosis hiperplásica crónica;
- A) Se diagnostica mediante foto.
 - B) Las placas blancas se desprenden con el raspado.
 - C) Necesidad de biopsia para diferenciarla de leucoplasia.
 - D) A y B son correctas.
- 103.-** En el estadije del carcinoma oral de células escamosas;
- A) T3, el tumor afecta a hueso cortical, seno maxilar o piel de la cara.
 - B) T3, el tumor es mayor de 4 cm de diámetro mayor.
 - C) N1, metástasis de un ganglio contralateral.
 - D) Mx, no existen metástasis a distancia.
- 104.-** ¿Cuál puede ser una causa de no éxito anestésico en anestias tronculares?, elija la errónea;
- A) Periodontitis apical
 - B) Uso de ultracaína sin vasoconstrictor.
 - C) Inyección del anestésico lejos del tronco nervioso.
 - D) Todas son correctas.
- 105.-** En la composición de la placa bacteriana de una encía sana, podemos encontrar preferentemente:
- A) Gram negativos.
 - B) Anaerobios y Espiroquetas.
 - C) Cocos gram positivos aerobios.
 - D) Actinobacillus Actinomycetencomitans.
- 106.-** El método usado para determinar la posición palatina o vestibular de un canino superior se denomina;
- A) Técnica de Clark
 - B) Técnica de Wolf
 - C) Técnica de Ericsson
 - D) Ninguna de ellas.
- 107.-** El linfoma No Hodgkin;
- A) Existe un riesgo aumentado de su aparición en la glándula parótida en pacientes con Sind Sjögren.
 - B) Sólo afecta a tejidos linfoides
 - C) Mejor pronóstico que linfoma Hodgkin.
 - D) En maxilar suele afectar a hueso y en mandíbula a tejidos blandos.
- 108.-** Qué asociación de antibiótico para el tratamiento periodontal produce sinergia;
- A) Clindomicina- pantomicina
 - B) Amoxicilina-metronidazol
 - C) Azitromicina-amoxicilina
 - D) Tetraciclina- metronidazol
- 109.-**Cuál de los siguientes componentes de la amalgama de plata presenta este porcentaje;
- A) Plata 65-70%.
 - B) Estaño 20-29%.
 - C) Cobre 8-12%.
 - D) Aluminio 0-3%

- 110.- El carcinoma oral de células escamosas;
- A) Más frecuente en jóvenes menores de 30 y en adultos, mayores de 70.
 - B) Corresponde al 50% de todos los tumores malignos orales.
 - C) Su incidencia es de 2-4%.
 - D) No aumenta la incidencia por la sinergia de consumo de alcohol y tabaco.
- 111.- En la osteítis condensante, marque la falsa;
- A) Son asintomáticos.
 - B) Debe realizarse tratamiento de conductos si la vitalidad pulpar es positiva.
 - C) No existe constricción apical.
 - D) Todas son ciertas.
- 112.- A qué categoría pertenecen los fármacos que han demostrado la ausencia de perjuicio en animales aunque no existe evidencia en humanos;
- A) A
 - B) B
 - C) C
 - D) D
- 113.- Con respecto a las infecciones herpéticas;
- A) El virus de la Mononucleosis es el virus VHH-4.
 - B) El virus de la leucoplasia vellosa es el virus Epstein-Barr.
 - C) Ambas son ciertas.
 - D) Ambas son falsas.
- 114.- Con respecto al síndrome de Treacher-Collins es falso que;
- A) Suele existir afectación del cóndilo y de la apófisis coronoides.
 - B) No existen malformaciones a nivel ocular ni orbitario.
 - C) Cursa con hipoplasia de los rebordes supraorbitarios
 - D) Existe un aumento de las impresiones digitales en el cráneo óseo, ausencia de celdillas mastoideas e hipoplasia de los senos paranasales
- 115.- En la técnica quirúrgica de extracción simple, ¿cuál es la primera fase?
- A) Sindesmotomía.
 - B) Luxación.
 - C) Prensión.
 - D) Ninguna de ellas.
- 116.- Indique la falsa con respecto a la glándula parótida;
- A) Entre sus dos porciones discurre el nervio facial.
 - B) Se separa de la glándula submandibular por el ligamento estilomandibular.
 - C) La arteria carótida externa es medial a la porción profunda.
 - D) Todas son ciertas.
- 117.- La elección de tratamiento en el líquen plano oral asociado a orabase;
- A) Propionato de clobetasol 0,1% una aplicación cada veinticuatro horas.
 - B) Propionato de clobetasol 0,25% una aplicación cada veinticuatro horas.
 - C) Propionato de clobetasol 0.01% dos aplicaciones al día.
 - D) Propionato de clobetasol 0.05% tres aplicaciones al día.
- 118.- Cual de las siguientes no es una clasificación de terceros molares inferiores;
- A) Winter.
 - B) Pell y Gregory.
 - C) Koerner
 - D) Todas son ciertas.
- 119.- Entre los materiales metálicos aloplásticos no se encuentra:
- A) Acero inoxidable.
 - B) Vitalio.
 - C) Artecoll.
 - D) Titanio.

- 120.- El sevoflurano;
- A) Posee una inducción y un despertar lentos.
 - B) La inducción se realiza a una concentración del 20%.
 - C) La concentración de mantenimiento es de 5%.
 - D) Ninguna es verdadera.
- 121.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la técnica de fuerza equilibrada?
- A) La lima se aplica pasivamente hasta el punto de inflexión y después se rota en sentido antihorario hasta completar uno o dos giros.
 - B) La dentina se toma con la lima, rotándola en sentido horario a lo largo de un arco de 90° y después en sentido antihorario con presión interna durante al menos un tercio de circunferencia como mínimo
 - C) Se hace oscilar la lima hacia delante y atrás entre 30-60° y se coloca se posición apical, para después rotarla 180° antes de extraerla.
 - D) Se introduce pasivamente una lima hasta el punto de inflexión y después se rota 180° en sentido horario aplicando presión apical, para después rotarla en sentido antihorario para extraer los restos orgánicos.
- 122.- La dosis letal de ión Flúor por kg de peso es a partir de;
- A) 10 mgr.
 - B) 20 mgr.
 - C) 40 mgr.
 - D) 70 mgr
- 123.- El absceso submaxilar no se propaga a la región parotidea por;
- A) El masetero.
 - B) La rama mandibular.
 - C) La aponeurosis cervical profunda.
 - D) Sí existe diseminación entre ambas regiones.
- 124.- El hipoclorito sódico;
- A) Es un agente quelante inorgánico.
 - B) La concentración máxima no debe exceder del 2'5 %.
 - C) Debe de ser el último irrigante en sangre a lo largo de la técnica de limpieza del conducto.
 - D) No se consume en el proceso de dilución.
- 125.- ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una característica farmacocinética de los bisfosfonatos?
- A) No son biodegradables. Son absorbidos, almacenados y excretados inalterados
 - B) Se fijan en la matriz ósea por tiempo prolongado. La vida media en el hueso es de varios años, más en el hueso trabecular que en el cortical
 - C) La vida media en el suero es corta, de pocas horas
 - D) Por vía oral la absorción es superior al 95%, disminuyendo con la comida, leche, zumos de naranja, café y calcio
- 126.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre enfermedad periodontal no es cierta?:
- A) Cursa a brotes.
 - B) Existe pérdida de soporte óseo.
 - C) Frecuentemente se acompaña de placa bacteriana
 - D) Es reversible.
- 127.- En la clasificación de reabsorción cervical invasiva de Heithersay;
- A) Los tipos I y II requieren tratamiento conservador y seguimiento.
 - B) El tipo III precisa de limpieza de conductos y sellado.
 - C) El tipo V precisa de extracción.
 - D) Todas son ciertas.

- 128.- De los siguientes factores, cuál no interviene en el crecimiento y desarrollo del esqueleto facial:
- A) El desarrollo del seno maxilar.
 - B) La sinfibrosis mandibular durante el primer año de vida.
 - C) El fibrocartilago del cóndilo mandibular.
 - D) El desarrollo del seno frontal
- 129.- La más común de las enfermedades periodontales es:
- A) Gingivitis descamativa.
 - B) Periodontitis crónica del adulto.
 - C) Gingivitis asociada a placa bacteriana.
 - D) Periodontitis prepuberal.
- 130.- El carcinoma verrugoso;
- A) Es un tumor maligno derivado del tejido conectivo.
 - B) Crece rápidamente y tiende a infiltrar tejidos profundos.
 - C) No suele producir metástasis en ganglios linfáticos.
 - D) Está indicado la radioterapia.
- 131.- El anillo linfático de Waldeyer lo forman las siguientes estructuras excepto;
- A) Amígdala lingual.
 - B) Amígdalas laríngeas palatinas tubáricas.
 - C) Amígdalas laríngeas.
 - D) Todas ellas conforman el anillo de waldeyer.
- 132.- El ameloblastoma radiográficamente se caracteriza;
- A) Imagen el panel de abejas.
 - B) Imagen en pompas de jabón.
 - C) Bordes bien delimitados pero no escleróticos.
 - D) Todas son ciertas.
- 133.- La fusión dentaria;
- A) Son bilaterales siempre.
 - B) En ocasiones se produce la unión entre diente normal y super numerario
 - C) Posee un patrón autosómico necesario
 - D) Se encuentra con más frecuencia en dientes permanente
- 134.- Con respecto a las anomalías dentarias coronarias
- A) El tubérculo de Bolk puede aparecer tanto en dentición temporal como permantente
 - B) El tubérculo de Carabgelli aparece en la mitad de la población
 - C) El diente evaginado corresponde a una anomalía radicular
 - D) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 135.- ¿Cuál de las siguientes lesiones contiene tejido de células gigantes?
- A) Granuloma periférico de células gigantes
 - B) Querubismo.
 - C) Quiste óseo aneurismático
 - D) Todas las anteriores
- 136.- En el síncope vasovagal tras anestésias locales;
- A) El pulso es rápido pero de corta duración.
 - B) Existen alteraciones respiratorias.
 - C) Mejora con la posición de Trendelenburg.
 - D) Conciencia siempre preservada.
- 137.- El biotipo de encía gruesa y cresta fina, corresponde:
- A) Tipo I.
 - B) Tipo II.
 - C) Tipo III.
 - D) Tipo IV.

- 138.- En la anestesia troncular del nervio dentario inferior;
- A) La rama de la mandíbula se sujeta por sus bordes anterior y posterior con el pulgar e índice respectivamente
 - B) El agujero mandibular está más alto en el adulto.
 - C) Se usan jeringas ultracortas de 15mm.
 - D) b y c son ciertas.
- 139.- La concentración de flúor en el circuito de agua potable de las escuelas debe oscilar entre:
- A) 0,7-1,2 ppm.
 - B) 1,3-3 ppm.
 - C) 3-5 ppm
 - D) 5-7 ppm
- 140.- El ameloblastoma;
- A) Es una neoplasia maligna.
 - B) Infiltrante a planos profundos.
 - C) Precisa tratamiento quirúrgico con resecciones mandibulares.
 - D) Todas son correctas
- 141.- La tromboflebitis de la vena facial como complicación de un canino superior incluido posee los siguientes signos excepto uno;
- A) Edema blando y difuso en párpado inferior.
 - B) La tumefacción no progresa hacia el párpado superior.
 - C) Deformación de la mejilla.
 - D) Deformación del surco nasogeniano.
- 142.- La psicosedación se emplearía:
- A) En niños no cooperativos.
 - B) Para disminuir la ansiedad.
 - C) Para quitar el dolor.
 - D) En niños cooperativos.
- 143.- Cuando la displasia fibrosa afecta a varios huesos y se asocia a pigmentación cutánea e hiperfunción de una o varias glándulas endocrinas de denomina:
- A) Displasia tipo Jaffe
 - B) Síndrome de McCune-Albright
 - C) Enfermedad de Ollier
 - D) Displasia neuroectodérmica
- 144.- La periodontitis apical sintomática purulenta se caracteriza por los siguientes síntomas y signos menos uno;
- A) Dolor intenso
 - B) Aumento del espacio periodontal
 - C) Movilidad dentaria
 - D) Fístula
- 145.- La necesidad del tratamiento endodóntico en un diente reimplantado tras avulsión;
- A) Siempre en casos de ápice cerrado.
 - B) Expectante en casos de ápice abierto.
 - C) Con ápice abierto y signos de infección.
 - D) Todas son correctas.
- 146.- Indique la respuesta correcta;
- A) La musculatura masticatorio deriva del 2º arco branquial.
 - B) La musculatura facial deriva del 1º arco branquial.
 - C) La musculatura deglutora deriva del 3º arco branquial.
 - D) Todas son ciertas.
- 147.- Los instrumentos rotatorios Profile;
- A) Producen una importante capa residual.
 - B) Funcionan a bajas velocidades y a velocidades variables.
 - C) No cumplen la normativa ISO relativa al diseño de instrumental.
 - D) Permiten reparar el conducto radicular desde el ápice a la corona

- 148.- Los odontomas;
- A) Se diferencian en simples y complejos.
 - B) Presentan un halo fino radiolúcido.
 - C) Son los 2º tumores odontogénicos más frecuentes.
 - D) Las recidivas son frecuentes
- 149.- Ante una pérdida prematura de un canino temporal unilateral observamos los siguientes signos excepto uno;
- A) Leve extrusión de los incisivos del mismo lado (sobre todo el lateral).
 - B) Desviación o no de la línea media.
 - C) Leve o ninguna linguoversión de los incisivos.
 - D) Inclinación de los incisivos hacia el espacio del canino perdido.
- 150.- ¿Qué nervio se encarga de la sensibilidad gustativa de los segundos tercios anteriores de la lengua?;
- A) Nervio supratimpánico.
 - B) Nervio infratimpánico.
 - C) A y B son correctas.
 - D) A y B son falsas.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- ¿En qué casos no debe de extraerse un diente?
- A) Paciente anticoagulado con un INR 2.3
 - B) Paciente en tratamiento con quimioterapia.
 - C) En ambas situaciones está contraindicado.
 - D) En ambas situaciones se puede proceder a la extracción.
- 152.- El colgajo modificado de Widman es una técnica;
- A) Regenerativa
 - B) Resectiva
 - C) Cirugía mucogingival
 - D) Ninguna de ellas
- 153.- Dentro de los agentes microbianos cuya presencia se relaciona como factor de riesgo en la periodontitis juvenil se encuentra:
- A) Actinobacillus Actinomycetemcomitans.
 - B) Prevotella intermedia.
 - C) Porphyromona ginigivalis.
 - D) Eikenella corrodens.
- 154.- Con respecto a la xerostomía, señale la falsa;
- A) Puede darse en ausencia de hiposialia
 - B) El 80% es de tipo medicamentoso.
 - C) Es referido por el 60 % de pacientes mayores de 65 años.
 - D) Se produce cuando la saliva estimulada es inferior de 1 ml/min.
- 155.- En el vaciamiento cervical radical del carcinoma oral de células escamosas , ¿qué estructura se preserva?
- A) ECM
 - B) Vena yugular interna.
 - C) Nervio espinal.
 - D) Todas se extirpan.
- 156.- La alveolitis seca se caracteriza;
- A) Dolor y trismos tras extracción.
 - B) Debe legarse el lecho para eliminar el dolor.
 - C) Manteniendo limpio el alveolo se resuelve en 5-10 días.
 - D) Todas son ciertas.

- 157.-** Respecto al granuloma central de células gigantes.
- A)** Lesiones que aparecen sobre todo en maxilar.
 - B)** Aparece en más del 60% en adultos por encima de 50 años.
 - C)** Más frecuente en hombres.
 - D)** Una alternativa al tratamiento quirúrgico en la infiltración con corticoides.
- 158.-** La localización del carcinoma oral de células escamosas en pacientes con leucoplasia verrucosa proliferativa es mayor en
- A)** Suelo de boca
 - B)** Lengua
 - C)** Encías
 - D)** Mucosa yugal
- 159.-** Los huesos de la bóveda craneal presentan crecimiento:
- A)** Endocondral
 - B)** Membranoso
 - C)** Cartilaginoso
 - D)** Cutáneo
- 160.-** Una de estas afirmaciones es falsa;
- A)** El tubérculo de Carabelli es una anomalía en la forma de la corona.
 - B)** El taurodontismo viene determinado genéticamente.
 - C)** La globodoncia es una deformidad globular de las coronas de los incisivos y caninos.
 - D)** El taurodontismo es una variación en la forma de la raíz

