



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 15 de noviembre de 2010 (B.O.C. nº 234 de 26/11/2010)

Categoría: PEDIATRAS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquema inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta .
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- Los Pediatras y enfermeras de Atención Primaria tienen un papel destacado en la prevención del maltrato infantil. Debemos buscar la existencia de abuso mediante (todas menos una)
 - A) El comportamiento de los padres
 - B) Si acude a las citas concertadas
 - C) La conducta del niño.
 - D) Cambios frecuentes de médicos
- 2.- El eritema tóxico del recién nacido:
 - A) Respeta palmas y plantas.
 - B) Suele aparecer entre el 2º y 4º día de vida.
 - C) Suele precisar tratamiento con antibióticos tópicos.
 - D) A y B son ciertas.
- 3.- Uno de los siguientes no se considera dentro de los aspectos de calidad de las compresiones torácicas en la reanimación cardiopulmonar básica:
 - A) Continuidad
 - B) Frecuencia adecuada
 - C) Profundidad de 1/3 del diámetro del tórax
 - D) Descompresión en la fase de diástole
- 4.- El agente etiológico bacteriano más frecuente en la OMA (otitis media aguda) es el:
 - A) Moraxella Catarrhalis.
 - B) Staphylococo Aureus
 - C) Streptococo Neumoniae
 - D) Haemophilus influenzae
- 5.- En cuanto a la actualización del calendario vacunal del niño inmigrante es falso:
 - A) Las correcciones del calendario se intentarán hacer con pautas aceleradas
 - B) Los intervalos mínimos entre dosis, como norma general, son de 4 semanas
 - C) Se seguirá la vacunación considerandose que dosis puesta es dosis válida
 - D) Si el registro no es fiable no se recomienda iniciar calendario vacunal completo conforme a su edad
- 6.- Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros de titularidad pública deberán indicar:
 - A) El sistema de información del fichero.
 - B) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
 - C) Las medidas de seguridad del máximo nivel exigible.
 - D) El edificio donde se guardarán dichos datos
- 7.- Valoramos a un niño de 6 meses, traído por su madre, que consulta por irritabilidad y mucosidad. El niño está sucio, lleva ropa inadecuada y el pañal no ha sido cambiado desde hace horas. Deberemos sospechar:
 - A) Una neumonía
 - B) Es una madre muy atareada
 - C) Abandono físico
 - D) Otitis media aguda
- 8.- En el Hipotiroidismo congénito.
 - A) Rasgos clínicos en el recién nacido en formas graves.
 - B) Se determina T.S.H.
 - C) Se debe realizar en las primeras cinco horas de vida.
 - D) A y B son correctas.

- 9.- La forma de presentación clínica más frecuente del tumor de Wilms es:
- A) Dolor abdominal
 - B) Hematuria
 - C) Masa abdominal
 - D) Pérdida de peso
- 10.- ¿En qué grupo es fundamental incidir en prevención de accidentes con especial énfasis?
- A) Familias que viven en viviendas unifamiliares.
 - B) Familias de riesgo social: bajo nivel socioeconómico, enfermedades psiquiátricas y abuso de sustancias.
 - C) Familias numerosas.
 - D) Padres primerizos.
- 11.- La obligación permanente de silencio que contrae el profesional sanitario respecto de todo lo sabido e intuido de un paciente en el transcurso de su relación profesional, constituye:
- A) La objeción de conciencia.
 - B) La clausula de conciencia.
 - C) El secreto profesional.
 - D) El deber de custodia de la historia de la historia clínica
- 12.- ¿Cuál de los siguientes indicadores es preferible utilizar si lo que se quiere valorar es la utilización de los servicios sanitarios por parte de la población?:
- A) Los años potenciales de vida perdidos
 - B) La esperanza de vida en buena salud.
 - C) La frecuentación hospitalaria
 - D) Los médicos por mil habitantes
- 13.- Paciente de 8 años que acude a consulta porque tras un traumatismo abdominal, en principio de baja potencia, presenta dolor abdominal cólico intenso y vómitos. La orina es de color rojo, escasamente teñida. A la exploración: alerta, cara de dolor, respiratorio normal, buen color piel, buen relleno capilar. El abdomen es normal y presenta puño percusión renal derecha positiva. Taquicardia y TA 130/75. La primera posibilidad diagnóstica es:
- A) El paciente está hemodinámicamente estable en situación de shock
 - B) Traumatismo de vías urinarias
 - C) Cólico nefrítico
 - D) Pielonefritis aguda
- 14.- El parámetro que mide la probabilidad que una persona clasificada como negativa (sana) por la prueba esté realmente sana se denomina :
- A) Valor predictivo positivo.
 - B) Valor predictivo negativo,
 - C) Sensibilidad.
 - D) Fiabilidad.
- 15.- Qué estudio es el más adecuado para estimar la prevalencia de una enfermedad en una población
- A) Casos y controles
 - B) Transversal
 - C) Cohorte prospectiva
 - D) Ensayo clínico

- 16.- Para extraer datos demográficos, se pueden utilizar los siguientes recursos
- A) El censo general
 - B) El padrón municipal
 - C) Los registros civiles
 - D) Todos los anteriores
- 17.- Cual de las siguientes asociaciones es falsa
- A) Trisomía 18 y pies en mecedora
 - B) Trisomía 13 y coartación de aorta
 - C) Trisomía 13 y labio leporino y/o hendidura del paladar
 - D) Trisomía 18 y anomalías renales
- 18.- Debemos comunicar en nuestra consulta el diagnóstico de un tumor de Wilms. Si seguimos la estrategia EPICEE para dar malas noticias incluiremos los siguientes pasos, menos:
- A) Preparar el Entorno, disponer de tiempo y evitar interrupciones
 - B) Conocer la Percepción de la enfermedad por el paciente y/o familia
 - C) Evitar explorar las Emociones del paciente
 - D) Establecer una Estrategia, resumir lo hablado, comprobar la comprensión y establecer plan de seguimiento
- 19.- Una pirámide de población de base ancha con disminución rápida de grosor hacia el vértice, es de:
- A) Tipo herradura.
 - B) Tipo pagoda
 - C) Tipo campana
 - D) Tipo bulbo
- 20.- Muerte Súbita del Lactante. Prevención
- A) Dormir boca abajo
 - B) Dormir en un colchón blando
 - C) No se relaciona con el tabaquismo materno en embarazo
 - D) Evitar exposición al humo del tabaco
- 21.- El grado en que pueden reproducirse los resultados obtenidos por un procedimiento de medida se denomina:
- A) Sensibilidad
 - B) Especificidad
 - C) Fiabilidad
 - D) Validez
- 22.- Con respecto al síndrome de Munchausen por poderes, señale la falsa
- A) Hasta en el 50% de los casos, existen trastornos o rasgos histéricos de la personalidad en la madre
 - B) La madre durante el ingreso se siente muy preocupada y dedicada al cuidado de su hijo
 - C) No existe discrepancia entre los datos clínicos y la historia clínica
 - D) Los signos y síntomas no están presentes en ausencia de la madre
- 23.- Son causa de hematuria de origen glomerular todas, excepto:
- A) Nefropatía por Ig A.
 - B) Lupus eritematosos sistémico.
 - C) Tumores de Wilms.
 - D) Síndrome de Good- Pasture.

- 24.- La herencia ligada al cromosoma X
- A) Afecta exclusivamente a las niñas
 - B) La hemofilia A se hereda mediante herencia dominante ligada al cromosoma X
 - C) Puede ser dominante o recesiva
 - D) En la herencia recesiva ligada al cromosoma X, la transmisión es por parte de la madre portadora sintomática
- 25.- ¿Qué principio de la bioética se expresa como respeto a la capacidad de decisión de los pacientes, proponiendo tener en cuenta sus preferencias?:
- A) Justicia
 - B) Beneficencia
 - C) No - maleficencia
 - D) Autonomía
- 26.- De las siguientes funciones de la familia cuál no se considera básica ?
- A) Capacidad de consumo
 - B) Comunicación
 - C) Autonomía.
 - D) Apoyo.
- 27.- Respecto al traslado de un caso urgente al hospital de referencia, señale lo falso:
- A) Es vital la estabilidad del tubo endotraqueal
 - B) Es fundamental el reconocimiento y tratamiento temprano del shock
 - C) Es imprescindible un acceso venoso adecuado
 - D) Lo prioritario es llegar al hospital cuanto antes
- 28.- En un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo hipolipemiente frente a la sinvastatina, se comete un error tipo II cuando
- A) Rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera en la población
 - B) Acepta la hipótesis nula cuando en realidad es falsa en la población
 - C) Acepta la hipótesis alternativa cuando en realidad es falsa en la población.
 - D) Los autores cometen un falso positivo
- 29.- La parte fundamental de la Historia Clínica está constituida por:
- A) Datos de el/la paciente
 - B) Lista de problemas
 - C) Factores de riesgo
 - D) Notas de evolución
- 30.- ¿Qué es la tasa de fecundidad?
- A) Número de nacidos vivos partido por el número de partos
 - B) Número de nacidos vivos en un periodo de tiempo, partido por el número de mujeres entre 15 y 45 años, por mil
 - C) Número de partos en un año, partido por el número de mujeres fértiles
 - D) Ninguna de la anteriores
- 31.- ¿Cuál de los siguientes trastornos endocrinos no se asocia con obesidad?
- A) Hipertiroidismo
 - B) Síndrome de Cushing
 - C) Hipogonadismo primario
 - D) Hiperinsulinismo

- 32.- Una niña de 2 años llega a Urgencias con tos perruna y estridor. El estado general y el color son normales, ¿Cuál es la impresión general ante esta paciente ?
- A) Es una laringitis aguda
 - B) Necesita tratamiento con dexametasona por vía oral
 - C) Sin auscultarle, no se puede conseguir una impresión general
 - D) Necesita oxígeno
- 33.- La causa más frecuente de hematuria no glomerular es:
- A) Enfermedad poliquística renal infantil.
 - B) Hipercalciuria idiopática.
 - C) Traumatismo renal.
 - D) Infección urinaria.
- 34.- Si un paciente decide negarse a recibir tratamiento (señale la respuesta incorrecta):
- A) Dicha negativa constará por escrito.
 - B) Prima el deber del médico sobre el derecho del paciente.
 - C) Tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley.
 - D) Todas son incorrectas.
- 35.- En el tratamiento de la talasemia minor está indicado:
- A) Hierro oral
 - B) Ácido fólico
 - C) Desferroxamina
 - D) Ninguno de los anteriores
- 36.- Un niño ecuatoriano de 4 años de edad, recién llegado de su país, refiere que ha vivido unos meses con un familiar al que han diagnosticado tuberculosis activa. El niño presenta una cicatriz por vacuna de BCG de recién nacido y está asintomático. Le hacemos un Mantoux y la lectura a las 72 horas es de 9 mm de induración transversal. ¿Cómo actuaría?
- A) Como el mantoux es > de 5 mm y ha habido exposición tuberculosa, lo considero positivo y lo estudiaría
 - B) Como el Mantoux es < de 10 mm, lo consideraría negativo
 - C) Como el niño está vacunado de BCG , está protegido y no precisa ninguna actuación
 - D) Lo consideraría positivo, lo trataría y no debería asistir a guardería hasta pasadas dos semanas de tratamiento
- 37.- En un niño ahogado, cianótico y sin latido cardiaco, ¿Qué es prioritario?
- A) Conocer cuánto tiempo hace que se ahogó
 - B) Masaje cardiaco
 - C) Liberar la vía aérea
 - D) Ventilación boca a boca
- 38.- Las voluntades anticipadas en el/la menor
- A) Pueden ser otorgadas por sus padres o tutores
 - B) El adolescente tiene capacidad legal para hacerlo
 - C) En ocasiones hay un dilema entre padres y pediatras e interviene el/la juez
 - D) Todas son correctas

- 39.- Los grados de recomendación para actividades preventivas (basada en evidencia científica). Señala la incorrecta
- A) Existe buena evidencia para recomendar la acción preventiva
 - B) No existe suficiente evidencia para recomendar que la acción preventiva sea excluida
 - C) Existe buena evidencia para recomendar que la preventiva sea excluida
 - D) Existe suficiente evidencia para recomendar la acción preventiva
- 40.- Los talones valgus se asocian con:
- A) Pie equino
 - B) Pie talo
 - C) Pie plano
 - D) Pie cavo.
- 41.- Se define como tos persistente o crónica en pediatría aquella cuya duración supera
- A) Los 10 días
 - B) Las 3- 4 semanas
 - C) Las 8 semanas
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta
- 42.- En relación a los Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral señale la cierta:
- A) La onda V no está presente desde el nacimiento.
 - B) Sus resultados no se ven afectados por la sedación del paciente.
 - C) Un resultado normal lleva implícito un desarrollo normal del lenguaje.
 - D) La onda V refleja la actividad del ganglio espiral.
- 43.- En un recién nacido con cianosis, cardiomegalia e hipovascularización pulmonar el diagnóstico más probable es:
- A) Transposición de Grandes Arterias + comunicación interventricular
 - B) Atresia pulmonar + septo íntegro
 - C) Tetralogía de Fallot
 - D) Atresia tricuspídea + estenosis pulmonar
- 44.- La entrevista clínica es una variedad de la entrevista :
- A) Dirigida.
 - B) Semiestructurada
 - C) Semidirigida
 - D) Libre
- 45.- La Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente NO MENCIONA:
- A) El derecho a la información asistencial.
 - B) El derecho a la intimidad.
 - C) Los contenidos imprescindibles de una prescripción de prótesis
 - D) Todas son mencionadas por la Ley 41/2002.
- 46.- En la escoliosis idiopática, señale la respuesta falsa:
- A) No suele producir dolor ni limitación de la movilidad de la columna vertebral.
 - B) Es más frecuente en adolescentes.
 - C) En algunas ocasiones se requiere descartar patología intrarraquídea o trastornos neuromusculares.
 - D) La progresión de la curva escoliótica, durante la fase de crecimiento puberal, es mayor en los niños que en las niñas.

- 47.- En cuanto a la prevención de la muerte súbita del lactante SMLS,
- A) Es la primera causa de muerte postneonatal en los países desarrollados
 - B) La máxima incidencia se produce entre los tres y cinco meses de edad
 - C) Hay un predominio del sexo masculino
 - D) El antecedente de un hermano muerto por SMLS, aumenta el riesgo de recurrencia en hijos posteriores
- 48.- ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la ecografía es falso?
- A) La ecografía es un método de imagen que proporciona información no sólo morfológica sino también dinámica.
 - B) La ecografía está contraindicada en un niño con sospecha de craneosinostosis.
 - C) Es una técnica inocua con incontables indicaciones.
 - D) La ecografía Doppler proporciona información sobre la vascularización de los distintos órganos y ayuda a caracterizar lesiones y masas.
- 49.- Niño de 9 años con tos seca frecuente, de predominio vespertino y durante la noche, que requiere el uso de salbutamol inhalado un par de veces a la semana, con episodios de mayor dificultad respiratoria con "pitos" que requieren tratamiento unas 5-6 veces al año. Su diagnóstico es:
- A) Asma episódica ocasional
 - B) Asma persistente moderado
 - C) Asma episódica frecuente
 - D) Fibrosis quística
- 50.- En cuanto a los dientes supernumerarios señale la respuesta falsa
- A) Tienen un componente hereditario
 - B) Son más frecuentes en el maxilar inferior
 - C) Se originan por hiperactividad de la lámina dentaria en la etapa de proliferación
 - D) Suelen ser un hallazgo radiológico
- 51.- Una prueba con alta sensibilidad:
- A) Presenta pocos falsos negativos
 - B) Presenta pocos falsos positivos.
 - C) Necesariamente tiene una especificidad alta.
 - D) Tiene una $p < 0,05$
- 52.- ¿Qué factores epidemiológicos están asociados al síndrome de muerte súbita del lactante?
- A) Bajo peso al nacer y test de Apgar alterado
 - B) Hábito tabáquico de la madre durante el embarazo y la lactancia
 - C) Escasos controles pre y postnatales
 - D) Todas las anteriores
- 53.- Recomendaciones para la detección precoz de los trastornos del espectro autista según la evidencia científica, Señala la incorrecta
- A) El MCHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), elaborado por Robins et al.(2001) es cumplimentado por padres/madres con la ayuda del pediatra
 - B) El seguimiento del desarrollo debe ser evaluado en todas las visitas del Programa de Salud Infantil desde la infancia hasta la edad escolar
 - C) El cribado específico de TEA usando el cuestionario MCHAT se realizará en caso de hermanos mayores con Trastorno del Espectro Autista
 - D) El cribado debe tener en cuenta, además de los síntomas asociados al autismo, cualquier retraso del lenguaje, dificultad de aprendizaje y síntomas de ansiedad o depresión

- 54.- Las epidemias por fuente única de exposición se caracterizan por los siguientes aspectos excepto:
- A) Solo se presentan en expuestos a la fuente de infección.
 - B) Carecen de limitación geográfica.
 - C) Explosividad de aparición.
 - D) Existen pocos casos secundarios.
- 55.- La coexistencia de Ag HBs y Ag HBe positivos con la positividad en suero de ADN- VHB, significa que estamos:
- A) Ante una hepatitis aguda por virus B.
 - B) Ante un paciente que ha pasado hepatitis B y ha quedado inmunizado.
 - C) En la fase replicativa de la infección por virus B de la hepatitis.
 - D) En la fase no replicativa de la infección por virus B de la hepatitis
- 56.- Si al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- A) La sensibilidad es del 90%
 - B) La especificidad es del 90%
 - C) La sensibilidad es del 10%
 - D) Todas son ciertas
- 57.- ¿Cuál de las siguientes medidas de la frecuencia de una enfermedad se puede calcular en un estudio transversal?
- A) Densidad de incidencia
 - B) Incidencia acumulada
 - C) Prevalencia
 - D) Fracción atribuible
- 58.- La Encuesta Nacional de Salud es publicada por:
- A) El Instituto Nacional de Estadística
 - B) El Ministerio de Trabajo e Inmigración
 - C) El Ministerio del Interior
 - D) Todos los anteriores
- 59.- ¿Cuál de las siguientes medidas es efectiva en la prevención de una crisis asmática?
- A) Vacunación de la gripe
 - B) Ejercicio en aire frío y seco
 - C) Evitar el uso de beta bloqueantes y aspirina
 - D) A y C son ciertas
- 60.- La anamnesis en la urgencia pediátrica se debe centrar sobre:
- A) El estado previo del paciente
 - B) El síntoma guía desencadenante de la urgencia
 - C) Los antecedentes personales y familiares
 - D) La historia integral del paciente
- 61.- El parvovirus B19 se relaciona además de la 5ª enfermedad con:
- A) Crisis de anemia aplásica.
 - B) Hidrops fetalis.
 - C) Síndrome en guante y calcetín.
 - D) Todas son correctas.

- 62.- Con respecto al tratamiento intensivo de la diabetes, es falso que:
- A) Tiene como objetivo mantener la glucemia preprandrial entre 70-120 mg/dl y la postprandrial menor de 180 mg/dl
 - B) Tiene como objetivo mantener la HbA1c menor del 6%
 - C) La incidencia de hipoglucemia está aumentada
 - D) Una de las complicaciones es la disminución de peso
- 63.- Las funciones de la vigilancia epidemiológica incluyen todas las que siguen, salvo:
- A) Recopilar toda la información necesaria y actualizada.
 - B) Procesar, analizar e interpretar los datos.
 - C) Hacer las recomendaciones pertinentes.
 - D) Siempre incluye funciones ejecutivas y de control.
- 64.- El score de Gorelick se usa para la valoración de:
- A) Estadio puberal.
 - B) Dificultad respiratoria.
 - C) Riesgo social.
 - D) Grado de deshidratación.
- 65.- Sobre los requisitos del consentimiento, señale la respuesta falsa:
- A) Debe ser voluntario
 - B) Debe anteceder a una información adecuada
 - C) Debe ser libre
 - D) Todas son incorrectas
- 66.- Las causas de cojera más comunes entre los 4 y 10 años son las siguientes, excepto:
- A) Enfermedad de Perthes
 - B) Sinovitis de cadera
 - C) Deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral
 - D) Artritis crónica juvenil
- 67.- ¿Cuál de las siguientes NO es una medida de frecuencia ?
- A) Prevalencia
 - B) Tasa
 - C) Proporción.
 - D) Riesgo relativo.
- 68.- Dentro de las indicaciones de la amoxicilina-clavulánico no está:
- A) Infecciones de orina
 - B) Neumonía por neumococo
 - C) Absceso dental
 - D) Infecciones de piel
- 69.- Educar para mejorar el modo de vida y conseguir un entorno saludable es:
- A) Prevención primaria de salud.
 - B) Tratamiento de los problemas de salud.
 - C) Promoción de salud.
 - D) Prevención secundaria de salud
- 70.- La etiología más frecuente de la Apnea Obstructiva del Sueño en el niño, es:
- A) Paladar hendido.
 - B) Anillo vascular.
 - C) Obesidad.
 - D) Hipertrofia de amígdalas y adenoides

- 71.- En un lactante, la causa menos frecuente de hemorragia digestiva baja es:
- A) Fisura anal.
 - B) Divertículo de Meckel.
 - C) Invaginación intestinal.
 - D) Sangre materna deglutida con la lactancia materna.
- 72.- Uno de los indicadores más utilizados para reflejar las tendencias de mortalidad prematura, una parte de la cual es teóricamente evitable, permitiendo así definir las prioridades de actuación es:
- A) Tasa de Mortalidad Específica por causa
 - B) Índice de Swaroop-Uemura
 - C) Tasa de Mortalidad
 - D) Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP).
- 73.- En el manejo agudo de las quemaduras en el niño está indicado lo siguiente salvo
- A) Antibióticos tópicos en las curas locales
 - B) Antibióticos sistémicos profilácticos
 - C) Escarotomía de urgencias en quemadura circunferencial que comprometa la circulación en cuello o miembros
 - D) Evaluar su estado de hidratación y pérdidas
- 74.- Usted contraindicaría la rehidratación oral en las siguientes situaciones excepto:
- A) Shock hipovolémico en país industrializado.
 - B) Alteración del nivel de conciencia.
 - C) Íleo paralítico.
 - D) Pérdidas fecales intermitentes menores de 10ml/kg/hora.
- 75.- El síndrome de Munchhausen por poderes se caracteriza por:
- A) La presencia o no de los padres durante el proceso diagnóstico es indiferente en su catalogación
 - B) Los padres suelen desconocer el tema sanitario
 - C) Los exámenes complementarios concuerdan con la clínica
 - D) Presencia de síntomas de difícil encasillamiento
- 76.- ¿De qué trata el Capítulo V de la Ley 41/2002?
- A) La Historia Clínica.
 - B) El respeto de la autonomía del paciente.
 - C) El informe de alta y otra documentación clínica.
 - D) El derecho de información sanitaria.
- 77.- El periodo crítico de aprendizaje de la masticación se sitúa entre
- A) Entre los 12 y 24 meses
 - B) Entre los 6 y 12 meses
 - C) A partir del tercer mes de vida
 - D) Entre el segundo y tercer año
- 78.- ¿Cuál de los siguientes hallazgos no encontraría en un recién nacido prematuro?:
- A) Escaso panículo adiposo
 - B) Pabellón auricular sin cartílago
 - C) Cráneo blando
 - D) Predominio de flexión en el tono muscular

- 79.- ¿Qué parámetro de los señalados se considera como un indicador administrativo para programas de prevención en la población de expuestos?
- A) La razón de incidencia
 - B) La tasa de incidencia
 - C) El riesgo atribuible
 - D) El riesgo relativo
- 80.- A un objeto (ropa, muebles, instrumental médico contaminado...) se le denomina ?
- A) Agente infeccioso.
 - B) Portador.
 - C) Fómite.
 - D) Vector.
- 81.- En qué parte del documento del consentimiento informado escrito se contiene la información sobre procesos alternativos para llevar a cabo el tratamiento o el diagnóstico?
- A) En el reverso
 - B) En el cuerpo
 - C) En el preámbulo
 - D) En la aceptación
- 82.- El riesgo de adquirir una enfermedad se mide por medio de:
- A) La Odds ratio
 - B) La incidencia acumulada
 - C) La razón de probabilidad
 - D) La prevalencia de periodo
- 83.- El pliegue cutáneo tricípital es útil para la valoración de
- A) Compartimento proteico muscular
 - B) Compartimento proteico visceral
 - C) Compartimento de grasa corporal
 - D) Compartimento de grasa visceral
- 84.- El método de evaluación económica que permite comparar diferentes programas alternativos que logran los mismos resultados en términos de salud es el:
- A) Análisis de Costes
 - B) Análisis Coste-Beneficio
 - C) Análisis Coste-Efectividad
 - D) Análisis Coste-Equidad
- 85.- En cuanto al secreto profesional señale la correcta:
- A) En los niños pequeños no importa que se rompa
 - B) Siempre que no se identifique al niño, se puede utilizar en cualquier publicación
 - C) Hay que mantenerlo, incluso con los padres, en mayores de 13 años maduros
 - D) Todas son correctas

- 86.-** Se diagnostica enfermedad tuberculosa sensible a la isoniacida a la madre de un lactante de 3 meses de edad. El niño está asintomático, tien Rx de tórax normal y la prueba de tuberculina negativa ¿ Que actitud es la correcta ?
- A)** No precisa inicialmente tratamiento. Repetir la prueba de tuberculina pasados 3 meses y si es positiva iniciar tratamiento con isoniacida
 - B)** Iniciar tratamiento con isoniacida y repetir la prueba de tuberculina pasados tres meses, de ser negativa suspender isoniacida.
 - C)** Tratar al lactante con isoniacida y rifampicina durante 6 meses.
 - D)** Por la elevada frecuencia de M tuberculosis resistente y la edad del paciente iniciaría tratamiento con etambutol y pirazinamida con repetición de la tuberculina pasados los tres meses.
- 87.-** Cual de los siguientes hallazgos en el examen físico del RN se considera patológico
- A)** Intumescencia mamaria
 - B)** Diastasis de rectos
 - C)** Hígado 2cm por debajo del reborde costal
 - D)** Frecuencia respiratoria de 65 respiraciones/minuto
- 88.-** Respecto a la dislexia....
- A)** Leen muy despacio y con continuas repeticiones. No hacen puntuaciones. Se observan confusiones de los grafemas cuya correspondencia fonética es parecida (t-d, ce-fe) o su forma semejante (P-q,d-b)
 - B)** Realizan con frecuencia rotaciones, inversiones (or-ro, cri-cir), omisiones (bar-ba, plato-pato), adiciones,sustituciones y fragmentaciones de las letras y/o las palabras
 - C)** Tienen dificultades para captar la fragmentación y ritmo de las frases.
 - D)** Todas las anteriores son correctas.
- 89.-** Con respecto a los trastornos funcionales de la eliminación, una de las siguientes propuestas no es cierta:
- A)** La enuresis nocturna monosintomática tiene una prevalencia del 50% en los niños de 5 años
 - B)** La prevalencia de la enuresis nocturna monosintomática es del 15% en los niños de 5 años.
 - C)** En la adolescencia la enuresis nocturna monosintomática tiene una incidencia del 1%.
 - D)** La encopresis tiene una prevalencia a los 7 años, en varones, del 2%
- 90.-** Dermatitis Atopica en los niños.
- A)** Nunca se produce sensibilización a alimentos.
 - B)** Los alimentos en algunos casos son responsables de exacerbaciones .
 - C)** Los alimentos suelen ser responsables de reacciones alérgicas de tipo inmediato
 - D)** B y C son correctas .
- 91.-** La hipótesis nula
- A)** Afirma que las diferencias encontradas las explica al azar
 - B)** Afirma que no hay diferencias significativas entre las encontradas
 - C)** Afirma que no existe asociación entre los fenómenos encontrados
 - D)** Todas son ciertas

- 92.- Con respecto a la tortícolis muscular congénita, señale la respuesta incorrecta:
- A) Cuando el niño tiene una tortícolis derecha, los ejercicios de estiramiento para tratarlo, consistirán en llevar la oreja derecha al hombro derecho y luego la barbilla hacia el hombro izqdo.
 - B) En un alto porcentaje de casos, la inclinación de la cabeza es hacia la derecha mientras que la barbilla señala hacia la izquierda.
 - C) Se pueden asociar a algún grado de luxación congénita de cadera.
 - D) Los niños que hacia el año de edad no han respondido de forma adecuada al tratamiento o han sido diagnosticados con retraso, pueden necesitar un tratamiento quirúrgico.
- 93.- ¿ Cual de las siguientes afirmaciones es verdad acerca de los trastornos específicos del aprendizaje ?
- A) Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar son trastornos en los que están deterioradas las formas normales del aprendizaje en las últimas etapas del desarrollo.
 - B) El deterioro de las formas normales del aprendizaje es consecuencia de traumas o enfermedades cerebrales adquiridas
 - C) Surgen por alteraciones de los procesos cognoscitivos, en absoluta secundarias a algún tipo de disfunción biológica
 - D) Su etiología es conocida , pero se acepta el predominio de los factores biológicos, en interacción con otros.
- 94.- Se llama prevalencia a:
- A) Número de casos nuevos que surgen en una población en un determinado periodo de tiempo.
 - B) Proporción de personas de una población que padecerá una enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo.
 - C) Número de casos (tanto antiguos como recientes) de una determinada enfermedad que existe en una población.
 - D) Seguimiento de cada uno de los miembros de una población.
- 95.- Un neumotórax a tensión se drenará:
- A) Cuando lo diagnostiquemos
 - B) Por el equipo de transporte cuando llegue a recoger al paciente
 - C) No se considera una lesión con riesgo inminente de muerte, por lo que no debemos precipitarnos
 - D) En el 6º espacio intercostal en la línea media axilar
- 96.- Atención al Niño inmigrante.
- A) No se les asigna pediatra hasta que tengan el nº de afiliación a la Seguridad Social .
 - B) La única forma de acceso al pediatra será sin cita.
 - C) Cada zona básica de salud en coordinación con los centros de atención al inmigrante de su zona debe formalizar por escrito los acuerdos que regulan la atención al menor.
 - D) La historia de salud no es preciso enviarla a otro centro en caso de traslado a otra comunidad.
- 97.- Respecto al suicidio en la infancia y adolescencia es cierto que :
- A) La prevalencia del suicidio ha disminuido en la última década
 - B) Es excepcional la tentativa de suicidio sin premeditación
 - C) La comorbilidad con la depresión es la más frecuente
 - D) El tratamiento de la tentativa de suicidio rara vez previene una nueva tentativa

- 98.-** En el diagnóstico de la cojera aguda, señala la falsa:
- A)** En los <3 años la artritis séptica y la luxación o subluxación de cadera son las patologías más frecuentes
 - B)** La sinovitis transitoria de cadera es la causa más frecuente de coxalgia en la infancia
 - C)** Las causas más frecuentes de cojera en la infancia están relacionadas con los traumatismos
 - D)** En los mayores de 11 años la causa más frecuente es la enfermedad de Perthes
- 99.-** El síndrome de Prader-Willi presenta algunos síntomas excepto:
- A)** Hipogonadismo o desarrollo sexual incompleto
 - B)** Talla alta y pubertad precoz
 - C)** Retraso mental o funcional en diferentes grados.
 - D)** Obesidad si no se controla la dieta.
- 100.-** Lactante de 10 meses que desde hace 2 días presenta tos, mocos claros y fiebre de 38°. A la auscultación presenta sibilantes diseminados y tiraje intercostal, sat O₂ 91%. Después de administrarle 2 series de salbutamol inhalado mejora clínicamente, la sat O₂ es 97% y han desaparecido los signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál sería su conducta?
- A)** Alta a domicilio y continuar con salbutamol 4 puff cada 4-6 h
 - B)** Derivar al hospital de referencia
 - C)** Indicar que acuda en 4 h para controlar evolución
 - D)** A y C son correctas
- 101.-** ¿Cuál de las siguientes consideraciones sobre el tratamiento de las heridas es falsa?
- A)** Lavado con suero fisiológico y desbridamiento del tejido devitalizado
 - B)** Las heridas limpias precisan cierre por segunda intención
 - C)** Las heridas producidas en lugares contaminados precisan antibioterapia profiláctica
 - D)** Las heridas producidas en los pies son de mayor riesgo de infección
- 102.-** En la dermatitis atópica del lactante, son criterios mayores de diagnóstico todos los referidos, excepto:
- A)** Prurito.
 - B)** Afectación facial y en zonas de extensión
 - C)** Historia familiar de enfermedad atópica.
 - D)** Xerosis.
- 103.-** Son signos de alerta en el desarrollo psicomotor cuando a los 3 meses presenta las siguientes manifestaciones menos una
- A)** Ausencia de sonrisa social
 - B)** No se mantiene sentado
 - C)** No fijación de la mirada / no respuesta a estímulos auditivos
 - D)** Hipotonía-hipertonía (manos cerradas, pulgar incluido)
- 104.-** En la etapa del preescolar aparecen las siguientes conductas en relación con la alimentación
- A)** Conducta de rechazo si se adoptan aptitudes rígidas
 - B)** Ingesta energética muy regular
 - C)** Inicio del consumo de golosinas
 - D)** Desarrollo de preferencias alimentarias

- 105.-** Educacion del paciente que ha tenido anafilaxia. No es cierto.
- A) Informar a el enfermo.
 - B) Informar a familiares.
 - C) No informar a tutores.
 - D) Conocer fuentes escondidas de alérgenos acultos.
- 106.-** El síndrome de Patau o Trisomia 13
- A) Los RN con trisomia 13 suelen necesitar asistencia médica desde el mismo momento del nacimiento
 - B) No es imprescindible realizar el cariotipo ya que el fenotipo es característico
 - C) Tiene una supervivencia elevada
 - D) El riesgo de recurrencia es alto siendo infrecuentes los abortos espontáneos
- 107.-** ¿Cuál es el denominador para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil?
- A) Número de niños menores de 7 años.
 - B) Número de niños menores de 1 mes.
 - C) Numero de nacidos vivos.
 - D) Número de niños menores de 1 año.
- 108.-** En la exploración oftalmológica del niño , ¿en qué consiste el test de Hirschberg?
- A) En comparar la agudeza visual de ambos ojos
 - B) En medir el grado de ambliopía
 - C) En visualizar el reflejo fotomotor
 - D) En visualizar el reflejo de una luz sobre las córneas
- 109.-** En las intoxicaciones pediátricas cual es el tóxico más frecuentemente implicado:
- A) Los medicamentos
 - B) Los productos domésticos de limpieza
 - C) Etanol
 - D) Drogas ilegales
- 110.-** La presencia en un lactante de una placa de alopecia levemente elevada, bien delimitada, de forma oval y color amarillo- naranja en región occipital superior nos sugiere:
- A) Aplasia cutis.
 - B) Granuloma eosinófilo.
 - C) Nevus sebáceo de Jadasshon.
 - D) Nevus verrucoso.
- 111.-** Si tuviera que elegir una sola característica entre las siguientes, para tomar la decisión de poner en marcha en su centro o consulta una determinada prueba de detección en fase presintomática (screening), escogería aquella que tuviera más:
- A) Sensibilidad
 - B) Especificidad
 - C) Valor predictivo positivo
 - D) Valor predictivo negativo.
- 112.-** ¿Cómo debemos tratar la fiebre?
- A) No se debe tratar sino produce discomfort en el niño
 - B) Son más efectivas las medidas físicas que los fármacos antitérmicos
 - C) La vía de elección el antitérmico será la rectal por su mejor tolerancia
 - D) Todas son ciertas

- 113.- En un niño de 5 años, la causa más frecuente de dolor de cadera y de cojera no traumática es :
- A) Enfermedad de Legg-Calvé- Perthes.
 - B) Sinovitis transitoria.
 - C) Artritis Séptica.
 - D) Artritis Crónica Juvenil.
- 114.- El factor desencadenante más importante de agudizaciones de asma en un niño de 2 años es:
- A) Inhalantes ambientales
 - B) Estrés
 - C) Infecciones vírica
 - D) Irritantes
- 115.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la anorexia nerviosa ?
- A) El sexo masculino es un factor de buen pronóstico en anorexia nerviosa.
 - B) La presencia de vómitos empeora el pronóstico
 - C) La edad de aparición temprana empeora el pronóstico
 - D) Los riesgos no modifican el pronóstico
- 116.- Acude una madre angustiada con un gusano de aproximadamente 20 cm que eliminó su hijo de 3 años por el ano estando previamente asintomático. ¿Cuál sería su actitud?
- A) Trataría al paciente afecto con mebendazol
 - B) Indicaría tratamiento con Mebendazol para toda la familia
 - C) Lo remitiría al Hospital de referencia para observación y estudio
 - D) Investigaría la existencia de animales domésticos que deben tratarse
- 117.- Todas las respuestas son manifestaciones de la otitis media, menos una:
- A) Otagia e irritabilidad.
 - B) Diarreas
 - C) Vómitos.
 - D) Pseudotumor cerebral.
- 118.- ¿En qué situación no está indicada la realización de una ecografía desde atención primaria?
- A) Ante la sospecha de una displasia de caderas en niños mayores de 6 meses
 - B) Estudio de dolor abdominal recurrente
 - C) Estudio de masas cervicales
 - D) Sospecha de patología intracraneal en lactantes con fontanela abierta
- 119.- El padrón municipal posee las siguientes características menos una, señálela:
- A) Obligatorio
 - B) Secreto
 - C) Directo
 - D) Universal
- 120.- En la entrevista clínica, ¿ cuál de las siguientes características del entrevistador alude a la capacidad para solidarizarse y comprender las emociones del paciente ?
- A) Calidez.
 - B) Asertividad.
 - C) Empatía.
 - D) Concreción.

- 121.- Si usted quiere medir la relación que existe entre un factor y un efecto, mediante la densidad de incidencia, con el fin de establecer una hipótesis causal, ¿Cuál de los siguientes es el estudio adecuado?:
- A) Ecológicos
 - B) Transversales
 - C) Cohortes
 - D) Casos y controles
- 122.- Trastorno por déficit atención e hiperactividad (TDAH).
- A) Para el diagnóstico es suficiente que se manifiesten los síntomas en un solo ambiente
 - B) Es más frecuente en Niñas
 - C) Es raro que exista co-morbilidad.
 - D) El diagnóstico es clínico
- 123.- El factor desencadenante más importante del asma en un niño de 2 años es:
- A) Alimentos
 - B) Infecciones víricas
 - C) Inhalantes ambientales
 - D) Estrés
- 124.- La causa más frecuente de pubertad precoz central en las niñas es:
- A) Hamartoma hipotalámico
 - B) Idiopática
 - C) Tumor secretor de GnRH
 - D) Enfermedad e Mc Cune-Albright
- 125.- En relación con la vitamina D, parece razonable establecer las siguientes recomendaciones: (Señala la verdadera)
- A) Los lactantes menores de un año lactados al pecho deben recibir un suplemento de 400 UI/día de vitamina D, iniciando su administración después del primer mes
 - B) Todos los lactantes menores de un año alimentados con sucedáneo de leche humana que ingieren menos de 2 litros diario de fórmula han de recibir un suplemento de 400 UI/día
 - C) Los niños mayores de un año o adolescentes, de forma general, se les recomienda para la adecuada producción de vitamina D la exposición al sol del medio día sin protección durante 10-15 minutos al día durante la primavera, el verano y el otoño
 - D) Los niños prematuros menores de un año de edad corregida no precisan una ingesta de vitamina D
- 126.- En el síndrome de muerte súbita del lactante es cierto que:
- A) El uso de chupete es un factor protector
 - B) El colecho no aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita
 - C) Es más frecuente en niños de peso elevado para la edad gestacional
 - D) No se ha relacionado con la toma de alcohol por parte de los padres
- 127.- Con respecto a la sensibilidad, señale lo incorrecto:
- A) Es el porcentaje de resultados positivos en pacientes con una determinada enfermedad.
 - B) Valora la capacidad de una prueba para detectar correctamente individuos sanos.
 - C) Una alta sensibilidad indica un bajo número de falsos negativos.
 - D) La sensibilidad expresa cuán " sensible " es la prueba a la presencia de la enfermedad.

- 128.-** Las quemaduras de segundo grado superficiales en el niño se caracterizan por todas las opciones siguientes, excepto una :
- A)** Aparición de ampollas
 - B)** Curan en 8- 10 días
 - C)** Suelen necesitar injertos en su curación
 - D)** Son dolorosas
- 129.-** Señale la respuesta incorrecta respecto a la ginecomastia puberal
- A)** Ocurre en niños entre 10 y 18 años de edad
 - B)** Suele ser menor de 4 cm de diámetro
 - C)** Es subareolar, móvil y no adherida a planos superficiales ni profundos
 - D)** Se debe a una reducción de la relación estrógenos/andrógenos por fallo de la degradación de los andrógenos
- 130.-** La Artritis Idiopática Juvenil
- A)** La forma de inicio sistémica no presenta fiebre
 - B)** En la forma de inicio oligo o pauciarticular se afectan un máximo de 4 articulaciones
 - C)** Las formas poliarticulares no pueden ser factor reumatoide positivo
 - D)** Las formas oligoarticulares generalmente presentan factor reumatoide positivo.
- 131.-** Lo más importante en la valoración de una primera crisis comicial es :
- A)** El EEG
 - B)** La realización de una TAC urgente
 - C)** La anamnesis y exploración física
 - D)** Iniciar precozmente el tratamiento antiepiléptico
- 132.-** ¿Cual es la infección bacteriana grave mas frecuente en los lactantes con fiebre?
- A)** Otitis media aguda
 - B)** Meningitis aguda
 - C)** Infección urinaria
 - D)** Gastroenteritis aguda
- 133.-** Que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un programa sobre prevención de riesgos en adolescentes:
- A)** El adolescente necesita demostrar y demostrarse la capacidad para desafiar las normas
 - B)** El adolescente tiene habitualmente un sentimiento de invulnerabilidad
 - C)** Las conductas de riesgo suelen ser de tipo reactivo y representan un cambio hacia su autonomía
 - D)** Hay que tener en cuenta todo lo anterior
- 134.-** ¿Cuál de estos problemas provoca mayor dificultad a la hora de atender a un niño inmigrante?
- A)** Problemas de lenguaje e idioma
 - B)** Nivel cultural muy bajo
 - C)** Situación no legalizada en España
 - D)** No aportación de documentos sobre vacunas

- 135.- Un niño de 7 años de edad ha sido tratado dietéticamente durante 4 meses de su hipercolesterolemia, sin disminución significativa de los niveles de colesterol. ¿Cuál sería la medida terapéutica que aplicaría usted para seguir tratando a este niño?:
- A) Administrar colestiramina
 - B) Administrar ácido nicotínico
 - C) Restringir el aporte de grasa a menos del 10% del total calórico
 - D) Ninguna de las anteriores
- 136.- Inmunodeficiencias congénitas o primarias:
- A) Salvo déficit de IG A.son poco frecuentes.
 - B) La sospecha diagnóstica sólo se puede realizar en nivel hospitalario.
 - C) En los déficit de producción de anticuerpos ,la clínica se inicia al nacimiento.
 - D) Todo lo anterior es cierto.
- 137.- ¿Cuál es la causa mas frecuente de dolor torácico en los niños ?
- A) Las alteraciones músculo-esqueléticas
 - B) Las enfermedades respiratorias
 - C) Las enfermedades cardiovasculares
 - D) Las causas psicógenas
- 138.- ¿Cuál de los siguientes signos no refleja un aumento del trabajo respiratorio ?
- A) Aleteo Nasal
 - B) Tiraje subcostal
 - C) Palidez
 - D) Retracción Xifoidea
- 139.- En una crisis de broncoespasmo leve-moderada en un niño de 3 años, colaborador, utilizaremos:
- A) Salbutamol en nebulización
 - B) Salbutamol con cámara espaciadora y mascarilla: 4 inhalaciones cada 20 minutos la primera hora
 - C) Budesonida inhalada
 - D) Bromuro de Ipatropio inhalado
- 140.- En cuanto a los terrores nocturnos, indicar la respuesta FALSA
- A) Ocurren en la fase 4 del sueño REM
 - B) La frecuencia es del 3%
 - C) La incidencia máxima es entre los 3-4 años
 - D) Suelen comenzar a las dos horas de dormirse
- 141.- Entre las anomalías de la relación de los maxilares con la base craneal están: señale la falsa
- A) Prognatismo
 - B) Micrognatismo
 - C) Retrognatismo
 - D) Anterrotación
- 142.- La etiología más frecuente, del flujo vaginal persistente, de una niña antes de la menarquía es:
- A) Leucorrea fisiológica.
 - B) Vaginitis por Cándida.
 - C) Vaginitis por Trichomonas .
 - D) Cuerpo extraño.

- 143.-** Un niño de 5 años de edad acude con su madre y con la policía a urgencias, refiriendo que su hijo ha sido violado por unos vecinos de 11 y 14 años. Ya han interpuesto denuncia en comisaría. Nuestra actitud será:
- A)** Esperar al forense para realizar la exploración
 - B)** Sugerir a la madre que se trata de juegos sexuales, normales para la edad
 - C)** Comenzar rápidamente la exploración para valorar las posibles lesiones perianales y genitales
 - D)** Pese a que el niño lo desea impedimos la presencia de la madre
- 144.-** ¿Qué factores ambientales están implicados en el síndrome de muerte súbita del lactante?
- A)** Dormir en decúbito prono
 - B)** El tabaquismo de la madre durante el embarazo y la lactancia
 - C)** El exceso de calor ambiental y de ropa o prendas de abrigo
 - D)** Todas las anteriores
- 145.-** Educación nutricional pediátrica.
- A)** Educar desde los primeros meses.
 - B)** Modificar hábitos nutricionales inadecuados en el ámbito familiar.
 - C)** Todo lo anterior es correcto.
 - D)** Todo lo anterior es incorrecto.
- 146.-** Con respecto a la vacunación del niño prematuro, señale la respuesta incorrecta:
- A)** Debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, independientemente de su edad gestacional y de su peso
 - B)** La dosis unitaria de cada vacuna es siempre igual a la empleada en un RNT.
 - C)** Las vacunas de rotavirus pueden administrarse en las unidades neonatales o en el medio hospitalario
 - D)** Las vacunas combinadas son las más adecuadas para esta población.
- 147.-** Señale la falsa:
- A)** El rotavirus es el principal agente productor de diarrea aguda a escala mundial en menores de 2 años.
 - B)** Los adenovirus suelen producir diarrea acompañada de síntomas respiratorios.
 - C)** Entre las bacterias, la Salmonella, es en la actualidad en España el patógeno más frecuente.
 - D)** Los noravirus producen cuadros de diarreas leves.
- 148.-** Se asocia a obesidad:
- A)** Prader-willi.
 - B)** Pseudohipoparatiroidismo.
 - C)** Bardet-Bield.
 - D)** Todas las anteriores.
- 149.-** Señalar lo falso:
- A)** Al inicio del estudio es necesario conocer la talla de los familiares.
 - B)** La mayoría de los niños con talla baja es patológica.
 - C)** La Celiaquía es una de las causas de Talla Baja.
 - D)** Otras causas de talla baja son las Displasias Esqueleticas .

150.- En relación a las curvas de crecimiento

- A) El peso como parámetro aislado tiene por si mismo validez
- B) La relación peso/edad (P/E) no es un buen indicador durante el primer año de vida
- C) El P/E debe usarse como parámetro de evaluación nutricional especialmente en > 2 años
- D) Se acepta como normal una variación de más menos 10 % con respecto al peso esperado

PREGUNTAS DE RESERVA

151.- La ictericia neonatal fisiológica se caracteriza por:

- A) Aparición en las primeras 24 horas
- B) Inicio en la cara con extensión al tronco y al resto del cuerpo.
- C) Desaparición en el recién nacido a término al final de la primera semana.
- D) B y C son ciertas

152.- El tipo de error que relaciona el hecho de trabajar con muestra en vez de con poblaciones se conoce como :

- A) Error sistemático.
- B) Sesgo de la información.
- C) Error aleatorio.
- D) Factor de confusión

153.- ¿ Cual de los siguientes fármacos tiene menor potencia en el tratamiento de la MDR-TB

- A) Pirazinamida
- B) Amikacina
- C) Levofloxacino
- D) Claritromicina

154.- Un paciente diagnosticado de hematuria secundaria a ejercicio físico intenso acude a su consulta por orinar rojo ¿ Cual es la actitud mas adecuada ?

- A) Confirmar la hematuria mediante, al menos, tira reactiva de orina, exploración y toma de constantes y, si están en límites normales, tranquilizar al paciente y observación domiciliaria
- B) Confirmar la hematuria mediante al menos, tira reactiva de orina, exploración Toma de constantes y, si están en límites normales, remitir al hospital para Estudio más amplio
- C) Prohibir la toma de antiinflamatorios no esteroides (AINE)
- D) Remitir preferentemente a su nefrólogo por un nuevo episodio

155.- En un niño con hipertensión arterial e historia clínica y examen físico normal, ¿cuál de estos estudios complementarios considera inicialmente menos adecuado?

- A) Creatinina, electrolitos, y hematocrito/hemoglobina en sangre
- B) Orina completa y urocultivo
- C) Ecografía abdominal
- D) Urografía intravenosa

156.- Acerca del uso de la aplicación tópica del tracolimus.

- A) Tiene efecto antiinflamatorio.
- B) Se usa en dermatitis leve.
- C) No es un corticoide.
- D) A y C son ciertas.

- 157.-** En cuanto a los requerimientos de la investigación pediátrica, es cierto que:
- A)** Pueden autorizarlo los/as pediatras sin informar a los/as niños/as
 - B)** Tiene que autorizarla los/as niños/as mayores de 5 años
 - C)** Los/as padres/madres de adolescentes no precisan el consentimiento del niño/a
 - D)** Es preciso el consentimiento informado
- 158.-** La forma más frecuente de presentación de la infección por Giardia Lamblia es
- A)** Diarrea.
 - B)** Abdomialgia.
 - C)** Síndrome de malabsorción
 - D)** Asintomática.
- 159.-** ¿Cuál de las siguientes asociaciones tóxico y antídoto específico es falsa?
- A)** Paracetamol y N-acetilcisteína
 - B)** Benzodiazepinas y flumazenil
 - C)** Metoclopramida y biperideno
 - D)** Organofosforado y acetilcolina
- 160.-** En una crisis asmática grave ¿Qué no indicaría como tratamiento inicial?
- A)** Salbutamol inhalado
 - B)** Prednisolona oral
 - C)** Bromuro de ipatropio inhalado
 - D)** Budesonida inhalada

