4.1 Sujetos a prescripción médica y autorizados para indicación enfermera

Se incluirán en esta guía todos aquellos que sean aprobados por el Ministerio en el futuro.

Según código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system); sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos en cinco niveles.

Tabla 7. Relación de fármacos o grupos de fármacos incluidos en esta guía por clasificación ATC[10]

ATC	Denominación ATC
N07BA03[49]	VARENICLINA
N07BA04[50]	CITISINICLINA

Fecha de revisión: Octubre 2023

Tabla 8. Propiedades, interacciones, contraindicaciones, efectos adversos y precauciones de estos fármacos

	Propiedades	Interacciones	Contraindicaciones	Efectos adversos	Precauciones
Vareniclina	• Agonista parcial de los receptores de acetilcolina a4 B2 • Biodisponibilidad oral no afectada por alimentos • No se afecta el citocromo p450. Excreción renal (92% inalterada)		Hipersensibilidad al Principio Activo	• Náuseas • Cefaleas • Mareos, Insomnio • Somnolencia, Sueños anormales	• Cimetidina, Insuficiencia renal grave • Embarazo / Lactancia • Epilepsia • Antecedentes de depresión mayor con ideación autolítica • Alto riesgo cardiovascular • Menores de 18 años
Citisina / Citisiniclina	• Agonista parcial de los receptores de acetilcolina a4 B2 • Acción adrenérgetica periférica • Biodisponibilidad oral no alterada por alimentos. Sin metabolismo hepático. Excreción renal (90% inalterada)	• Fármacos antituberculosos • Anticonceptivos hormonales • Productos con nicotina (riesgo de intoxicación)	• Embarazo / Lactancia • Angina inestable • Cardiopatía isquémica • Accidente cardiovascular • Reciente arritmias con relevancia clínica	• Náuseas • Diarrea • Dolor abdominal • Mareos • Cefaleas • Taquicardia • Hipertensión arterial • Insomnio • Somnolencia • Sueños anómalos • Pesadillas	• Cardiopatía isquémica • Insuficiencia cardíaca • Hipertensión arterial • Feocromocitoma • Ateroesclerosis y otras vasculopatías periféricas • Úlcera gástrica y duodenal • Enfermedad por reflujo gastroesofágico • Hipertiroidismo • Diabetes • Esquizofrenia

4.2 No sujetos a prescripción médica

Terapia Sustitutiva de la Nicotina (TSN) que se define como la administración de nicotina por una vía diferente a la del consumo del cigarrillo, y en una cantidad suficiente para disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia, pero insuficiente para crear dependencia. La administración se hace por vía oral, si se trata de chicles de nicotina, inhalador bucal, caramelos de nicotina, tabletas sublinguales, por vía transdérmica si se utilizan los parches de nicotina, y por vía nasal si se utiliza el spray nasal.

Terapia sustitutiva con nicotina (TSN)	Chicles
	inhalador bucal
	caramelos y tabletas sublinguales
	Parches transdérmicos
	spray nasal